



Agromaster®

10-5-23+2CaO+5MgO+29SO3

Řízený přísun dusíku i v nejnáročnějších povětrnostních a půdních podmínkách.

10 | 5 | 23 | 2.0 | 5.0 | 29.0
N P2O5 K2O CaO MgO SO3



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	10%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	1.6%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	2.3%
	Močovinový dusík (N-Urea)	6.1%
P2O5	Oxid fosforečný	5%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	3.8%
K2O	Oxid draselný	23%
	vodorozpustný (K ₂ O)	23.0%
CaO	Oxid vápenatý	2.0%
	vodorozpustný (CaO)	2.0%
MgO	Oxid hořečnatý	5.0%
SO3	Oxid sírový	29.0%

Popis

Přísun draslíku pro vaše brambory, ovoce a zeleninu. Toto NPK hnojivo s vysokým obsahem draslíku, přidanou sírou, hořčíkem a vápníkem a 61% obsahem obaleného dusíku je ideální pro plodiny se středně dlouhým vegetačním cyklem pěstované v lehké půdě. Díky patentované technologii E-Max Release Technology společnosti ICL si můžete být jisti, že vaše rostliny budou mít 2-3měsíční zásobu dusíku i v těch nejnáročnějších povětrnostních a půdních podmínkách.

Výhody

- \\ Lepší účinnost využití dusíku oproti konvenčním hnojivům
- \\ Vysoký obsah draslíku pro zvýšení výnosů
- \\ Vápník navíc pro lepší skladovatelnost
- \\ Vysoký obsah síry - pro zlepšení příjmu dusíku
- \\ Šetrnější k životnímu prostředí, nižší míra vyplavování, volatilizace a denitrifikace

Návod k použití

- 1 Apply by broadcasting, row, or bed application. Agromaster lze aplikovat rozhozem, do řádku či lokalizovaně na jedno místo.
- 2 Zapravte do půdy do hloubky 5 až 10 cm.
- 3 Je-li instalovaný systém kapkové závlahy, aplikujte Agromaster do blízkosti kapačů.
- 4 Doporučujeme po aplikaci zavlažit.
- 5 Skladujte v suchu.
- 6 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 7 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Plodiny	Dávkování
Brambory	400-800 kg/ha
Zelenina pěstovaná na poli	
Rajčata, paprika a lilek	400-800 kg/ha
Okurka, cuketa, meloun a vodní meloun	400-800 kg/ha
Cibule, česnek	400-800 kg/ha
Mrkev a další kořenová zelenina	400-800 kg/ha
Ledový salát	400-800 kg/ha
Drobné ovoce pěstované v půdě	
Jahody	400-800 kg/ha

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.