



Agroleaf[®] Liquid

High P

Vysoký obsah fosforu pro spokojené a produktivní plodiny

5 | 25 | 5 | TE
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	5%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	5%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	25%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	25%
K ₂ O	Oxid draselný	5%
	vodorozpustný (K ₂ O)	5%
B	Bór	0.02%
	vodorozpustný (B)	0.02%
Cu	Měď	0.002%
	vodorozpustná (Cu)	0.002%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.002%
Fe	Železo	0.060%
	vodorozpustné (Fe)	0.060%
	Železo (Fe) jako EDDHA chelát	0.06%
Mn	Mangan	0.030%
	vodorozpustný (Mn)	0.030%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.030%
Mo	Molybden	0.002%
	vodorozpustný (Mo)	0.002%
Zn	Zinek	0.015%
	vodorozpustný (Zn)	0.015%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.015%

Popis

Agroleaf Liquid High P je vysoce kvalitní tekutá NPK listová výživa určená zejména pro prevenci či nápravu nedostatku fosforu. Produkt je obohacen komplexem stopových prvků ve formě chelátů. Produkt Agroleaf Liquid High P vyniká čistotou a vysokou kvalitou živin a je určen pro korekci nedostatku fosforu, na podporu růstu kořenového systému a kvetení. Jeho účinek ještě zvyšuje technologie F3 SurfActive a specifický komplex stopových prvků ve formě chelátů. Neiontové surfaktanty obsažené v technologii F3 SurfActive jsou přímo odpovědné za účinnost postřiku. HEEDTA chelát železa zvyšuje flexibilitu produktu při použití s postřiky v širším rozmezí pH.

Výhody

- \\ Ideální pro prevenci či nápravu nedostatku fosforu
- \\ Obohacen komplexem stopových prvků ve formě chelátů
- \\ Lepší pokrytí, přilnavost a dostupnost živin

Návod k použití

- 1 Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.
- 2 Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřik před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.
- 3 Vyhněte se postřiku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Pěstovaná plodina	Dávka (l/ha)	Mn. vody (l/ha)	Koncentrace (%)	Aplikace
Plodící zelenina	3-6	300-600	1	1 týden po přesazení, před a po kvetení, 2-3 krát
Listová zelenina, Brukev, květák, brokolice	3-6	300-600	1	1 týden po přesazení, před a po kvetení 2-3 krát
Cibule, česnek	3-6	300-600	1	Při 2-3 listech, 1-2 krát
Drobné ovoce, sady, vinice	3-6	600-1000	0.5-0.6	Před kvetením a 2 týdny před sklizní, 1-2 krát
Brambory	3-6	250-300	1.2-2	Před nasazením hlíz, 1-2 krát
Kukuřice	3-6	200-300	1.5-2	Při 4-6 listech, 1-2 krát
Řepka olejná	3-6	200-300	1.5-2	Na podzim nebo brzy na jaře
Okrasné rostliny	2-3	600-1000	0.3	1 týden po přesazení či dle potřeby a před kvetením, 1-2 krát

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvyšte, použijete-li větší množství vody. Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.