



Agroleaf[®] Liquid

Manganese

Tekutý mangan pro plnohodnotnou fotosyntézu

0 | 0 | 0
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%
K ₂ O	Oxid draselný	0%
Mn	Mangan	6.00%
	vodorozpustný (Mn)	6.00%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	6.00%

Popis

Agroleaf Liquid Manganese je vysoce kvalitní tekuté listové hnojivo určené zejména k prevenci a kontrole nedostatku manganu. Agroleaf Liquid Manganese neobsahuje žádný sodík. Jeho složení umožňuje široké použití na všechny typy plodin. Účinek tohoto hnojiva ještě zvyšuje technologie F3 SurfActive. Mangan hraje důležitou roli při fotosyntetické aktivitě rostlin. Má přímý vliv na vyšší obsah sušiny a přispívá k toleranci abiotické zátěže.

Výhody

- \\ Ideální pro prevenci a nápravu nedostatku manganu
- \\ Vhodné pro širokou škálu plodin
- \\ Lepší pokrytí, přilnavost a dostupnost živin

Návod k použití

- 1 Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.
- 2 Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřik před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.
- 3 Vyhněte se postřiku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Pěstovaná plodina	Dávka (l/ha)	Mn. vody (l/ha)	Koncentrace (%)	Aplikace
Plodící zelenina	1-2	300-600	1	V průběhu celého cyklu, 3-4 krát
Cukrová řepa	1-2	250-400	0.4-0.5	Při 6-8 listech
Drobné ovoce, sady, vinice	2-3	600-1000	0.3	Od nasazení plodů do sklizně, 3-4krát
Brambory	1-2	250-300	0.4-0.7	Počátek zavírání řádků, 2-3 krát
Kukuřice	1-2	200-300	0.5-0.7	Při 4-6 listech
Řepka olejná	1-2	200-300	0.5-0.7	Od jara až do kvetení
Obiloviny	1-2	200-300	0.5-0.7	Brzy na jaře

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvyšte, použijete-li větší množství vody. Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.