



Agroleaf[®] Liquid

Moly B

 Prémiové tekuté hnojivo s bórem a molybdenem

4

N

16

P₂O₅

4

K₂O

TE

Popis

Agroleaf Liquid MolyB je vysoce kvalitní tekuté listové NPK hnojivo obohacené bórem a vysoce koncentrovaným molybdenem. Toto hnojivo bylo vyvinuto pro plodiny s vysokými nároky právě na tyto dva stopové prvky – bór a molybden, a pro rychlé řešení nápravy v případě jejich nedostatku. Molybden je nedílnou součástí dvou enzymů, které přeměňují amoniak na dusitany a dále na dusičnany, které rostliny používají k syntéze aminokyselin. Také jej potřebují dusík vázající bakterie žijící v symbioze s luštěninami, aby mohli vázat atmosferický dusík. Rostliny také využívají molybden při přeměně anorganického fosforu na jeho organickou formu. Jeho účinek ještě zvyšuje technologie F3 SurfActive. Neiontové surfaktanty obsažené v technologii F3 SurfActive jsou přímo odpovědné za účinnost postřiku.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	4%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	2.6%
	Močovinový dusík (N-Urea)	1.4%



P ₂ O ₅	Oxid fosforečný vodorozpustný (P ₂ O ₅)	16% 16%
K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	4% 4%
B	Bór vodorozpustný (B)	0.1% 0.1%
Mo	Molybden vodorozpustný (Mo)	2% 2%

Výhody

- ▬ Předchází a koriguje nedostatek boru a molybdenu
- ▬ Vhodné pro širokou škálu plodin
- ▬ Lepší pokrytí, přilnavost a dostupnost živin

Dávkování

Pěstovaná plodina	Dávka (l/ha)	Mn. vody (l/ha)	Koncentrac e (%)	Aplikace
Plodící zelenina, brambory	0.5-1	300-600 250-300	0.2 0.2-0.3	V průběhu celého cyklu. Pro polní plodiny – po uzavření řádků
Luštěniny (sójové boby)	1-2	300	0.3-0.7	Při 6 listech
Zelí, květák, brokolice	1-3	300-600	0.3-0.5	Od 6-8 listů, 2-3 krát



Řepka olejná	0.5-1 1-2	200-300	0.25-0.5 0.3-0.7	Na podzim Na jaře, do kvetení, 2 krát
Slunečnice	1-3	200-300	0.5-1	Při 4-6 listech
Cukrová řepa	1-3	250-400	0.4-0.8	Při 6-8 listech
Pastviny	0.5-1	200-300	0.25-0.3	V průběhu celého cyklu, 2-3 krát

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvyšte, použijete-li větší množství vody.

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

- 1 Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.
- 2 Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřik před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.
- 3 Vyhněte se postřiku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/agriculture/products/agroleaf-liquid-moly-b/>
: 12/05/2024