



Agroleaf[®] Liquid

Balance

Zajistěte vyváženou výživu svých plodin.

10 | 10 | 10 | TE
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	10%
	Močovinový dusík (N-Urea)	10%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	10%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	10%
K ₂ O	Oxid draselný	10%
	vodorozpustný (K ₂ O)	10%
B	Bór	0.02%
	vodorozpustný (B)	0.02%
Cu	Měď	0.002%
	vodorozpustná (Cu)	0.002%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.002%
Fe	Železo	0.060%
	vodorozpustné (Fe)	0.060%
Mn	Mangan	0.030%
	vodorozpustný (Mn)	0.030%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.030%
Mo	Molybden	0.001%
	vodorozpustný (Mo)	0.001%
Zn	Zinek	0.015%
	vodorozpustný (Zn)	0.015%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.015%

Popis

Agroleaf Liquid Balance je vysoce kvalitní tekutá NPK listová výživa s vyváženým obsahem živin. Produkt je obohacen komplexem stopových prvků ve formě chelátů. Produkt Agroleaf Liquid Balance vyniká čistotou a vysokou kvalitou živin a rostlinám v různých vývojových fázích je schopen poskytnout vyváženou výživu. Jeho účinek ještě zvyšuje technologie F3 SurfActive a specifický komplex stopových prvků ve formě chelátů. Neiontové surfaktanty obsažené v technologii F3 SurfActive jsou přímo odpovědné za účinnost postřiku. HEEDTA chelát železa zvyšuje flexibilitu produktu při použití s postřikem v širším rozmezí pH.

Výhody

- \\ Poskytuje vyváženou výživu, která snižuje stres u vašich plodin.
- \\ Obohaceno o chelátované stopové prvky
- \\ Lepší pokrytí, přilnavost a dostupnost živin

Návod k použití

- 1 Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.
- 2 Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřik před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.
- 3 Vyhněte se postřiku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Pěstovaná plodina	Dávka Mn. vody Koncentrace			Aplikace
	(l/ha)	(l/ha)	(%)	
Plodící zelenina	3-6	300-600	1	Zakořenění a vegetativní růst, 1–2 krát
Brukev, květák, brokolice	3-6	300-600	1	Po uzavření řádku, 1–2 krát
Cibule, česnek	3-6	300-600	1	Po 8-9 listech, 1–2 krát
Drobné ovoce, ovocné sady, vinice	1-4	600-1000	0.2-0.4	Vegetativní růst, 1–2 krát
Obiloviny	3-6	200-300	1.5-2	Druhé internodium – praporcový list
Kukuřice	3-6	200-300	1.5-2	Při 8-10 listech
Řepka olejná	3-6	200-300	1.5-2	Podzim nebo časně jaro
Slunečnice	3-6	200-300	1.5-2	Při 4–6 listech
Okrasné rostliny	2-3	600-1000	0.3	V průběhu celého cyklu, 2–3 krát

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvyšte, použijete-li větší množství vody. Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.