



Agroleaf[®] Liquid

Iron

Při nedostatku železa

0 | 0 | 0 | TE
N P2O5 K2O



Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	0%
P2O5	Oxid fosforečný	0%
K2O	Oxid draselný	0%
Fe	Železo	4.400%
	vodorozpustné (Fe)	4.400%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	4.400%

Popis

Agroleaf Liquid Iron je vysoce kvalitní tekuté hnojivo určené zejména k prevenci a kontrole nedostatku železa. Jeho složení umožňuje široké použití na všechny typy plodin. Účinek hnojiva ještě zvyšuje použití technologie F3 SurfActive. Železo je nezbytné pro syntézu proteinů a chlorofylu. Jedná se o důležitou součást mnoha enzymů, které se podílejí na přenosu energie a dýchání a rovněž na redukci a vázání dusíku.

Výhody

- \\ Dodává rostlinám potřebnou výživu v podobě železa.
- \\ Skvělé pro širokou škálu plodin, zejména pro drobné ovoce.
- \\ Lepší pokrytí, přilnavost a dostupnost živin

Návod k použití

- 1 Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.
- 2 Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřik před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.
- 3 Vyhněte se postřiku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Pěstovaná plodina	Dávka (l/ha)	Mn. vody (l/ha)	Koncentrace (%)	Aplikace
Plodící zelenina	3-6	300-600	1	V průběhu celého cyklu, 3-4 krát
Jahody	3-6	250-400	1.2-1.5	V průběhu celého cyklu, 3-4 krát
Borůvky	3-6	250-400	1.2-1.5	V průběhu celého cyklu, 3-4 krát
Ostatní drobné ovoce	3-6 5-8	600-1000	0.5-0.6 0.8	během celého cyklu pěstování, 3-4krát kurativní aplikace
Drobné ovoce, sady, vinice	3-5 5-7	600-1000	0.5-0.6 0.8	během celého cyklu pěstování, 3-4krát kurativní aplikace
Drobné ovoce, sady, vinice	3-5 5-7	600-1000	0.5-0.6 0.8	během celého cyklu pěstování, 3-4krát kurativní aplikace
Okrasné rostliny	2-3	600-1000	0.3	během celého cyklu pěstování, 3-4krát kurativní aplikace

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvyšte, použijete-li větší množství vody. Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.