



**Osmocote[®]
Start**

Start

Optimální pro vaše rostliny citlivé na zasolení od začátku až do konce

11 | 11 | 17 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Složení

oxide		
N	Celkový dusík	11%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	4.5%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	6.5%
	Močovinový dusík (N-Urea)	0%
	Dusík v organické formě	0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	11%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	8.2%
K ₂ O	Oxid draselný	17%
	vodorozpustný (K ₂ O)	17.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%
	vodorozpustný (MgO)	1.0%
B	Bór	0.01%
	vodorozpustný (B)	0.01%
Cu	Měď	0.090%
	vodorozpustná (Cu)	0.080%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.090%
Fe	Železo	0.38%
	vodorozpustné (Fe)	0%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.17%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0%
	Železo (Fe) jako EDDHA chelát	0%
Mn	Mangan	0.05%
	vodorozpustný (Mn)	0%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0%
Mo	Molybden	0.009%
	vodorozpustný (Mo)	0.006%
Zn	Zinek	0.014%
	vodorozpustný (Zn)	0.007%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0%

Popis

Osmocote Start je obalované hnojivo 2. generace, které je vysoce účinné při výživě rostlin s kratším pěstebním cyklem rodu Viola, Primula nebo Impatiens. Zároveň také může sloužit k dodatečné výživě rostlin po dobu 6 týdnů. Je rovněž ideální pro rostliny citlivé na zasolení a řízkované rostliny, které obtížně koření.

Výhody

- \\ Lepší kořenění a barva rostlin
- \\ Vynikající účinnost s menšími ztrátami živin vymýváním
- \\ Bezpečné použití, nízké zasolení substrátu

Návod k použití

- 1 Osmocote Start může být aplikován na povrch substrátu, pokud je zajištěno, že granule neulpí na listech.
- 2 Skladujte v suchu.
- 3 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

	Nízká dávka hnojiva	Průměrná dávka hnojiva
Kontejnerové školky	0.5-1.5 g/l	1.5-2.5 g/l
Hrnkové rostliny	0.5-1.5 g/l	1.5-2.5 g/l
Balkonové a záhonové rostliny	0.5-2.0 g/l	-
Mladé rostliny	0.5-1.5 g/l	1.5-2.5 g/l

Důležité upozornění: Výše uvedené dávky se doporučují pro nehnojené substráty. Jedná se pouze o obecné doporučení. Dávkování je třeba upravit pro specifické podmínky jako je pěstování v tunelech, sklenících a v případech specifických klimatických podmínek. Produkt se nedoporučuje při přepichování a/nebo podzimní/zimní přesazování. Podrobnější doporučení žádejte od našeho technického poradce. Každou změnu dávkování, způsobu aplikace a jiných kultivačních zásahů napřed vždy vyzkoušejte na malém vzorku. Protože pěstební podmínky se mohou lišit a společnost ICL nemůže ovlivnit aplikaci produktů, není ani odpovědná za případné negativní výsledky.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.