



Agromaster®

11-8-27+3CaO+12.5SO₃

Lepší využití dusíku, zejména v lehkých půdách

11 | 8 | 27 | 3.0 | 12.5
N P₂O₅ K₂O CaO SO₃



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	11%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	3.8%
	Močovinový dusík (N-Urea)	6.8%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	8%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Oxid draselný	27%
	vodorozpustný (K ₂ O)	27.0%
CaO	Oxid vápenatý	3.0%
	vodorozpustný (CaO)	3.0%
SO ₃	Oxid sírový	12.5%

Popis

Agromaster® 11-8-27+3CaO+12,5SO₃ je hnojivo s řízeným uvolňováním živin s vysokým obsahem draslíku v kombinaci s vysokým obsahem obaleného dusíku. Je ideální pro plodiny se středně dlouhým vegetačním cyklem pěstované v lehké půdě jako brambory, polní zelenina a rajčata. Díky patentované technologii E-Max Release Technology společnosti ICL si můžete být jisti, že vaše rostliny budou mít 2-3měsíční zásobu živin i v těch nejnáročnějších povětrnostních a půdních podmínkách.

Výhody

- \\ Řízené uvolňování živin zajistí jednotnou velikost plodů
- \\ Obsahuje sulfáty, které zajišťují dodávku síry rostlině
- \\ Přídavek hořčíku zvyšuje tvorbu chlorofylu a podporuje fotosyntézu

Návod k použití

- 1 Agromaster lze aplikovat rozhozem, do řádku či lokalizovaně na jedno místo.
- 2 Zapravte do půdy do hloubky 5 až 10 cm.
- 3 Je-li instalovaný systém kapkové závlahy, aplikujte Agromaster do blízkosti kapačů.
- 4 Doporučujeme po aplikaci zavlažit.
- 5 Skladujte v suchu.
- 6 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 7 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Plodiny	Dávkování
Brambory, zejména pěstované na lehkých půdách	400-800 kg/ha
Polní zelenina - kapusta, cibule a kořenová zelenina	400-800 kg/ha
Rajčata na zpracování	400-800 kg/ha

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.