



Agromaster®

12-5-20+2CaO+4MgO+35SO₃

Hnojivo pro skvělé výnosy

12 | 5 | 20 | 2 | 4.0 | 35
N | P₂O₅ | K₂O | CaO | MgO | SO₃



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	12%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	1.4%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	5.7%
	Močovinový dusík (N-Urea)	4.9%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	5%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	3.8%
K ₂ O	Oxid draselný	20%
	vodorozpustný (K ₂ O)	20%
CaO	Oxid vápenatý	2%
	vodorozpustný (CaO)	2%
MgO	Oxid hořečnatý	4.0%
SO ₃	Oxid sírový	35%

Popis

Agromaster® 12-5-20+2CaO+4MgO+35SO₃ je hnojivo s řízeným uvolňováním živin s vysokým obsahem draslíku a přidaným vápníkem, hořčíkem a sírou. Obsahuje 41 % obaleného N. Díky patentované technologii E-Max Release Technology společnosti ICL si můžete být jisti, že vaše rostliny budou mít 2-3měsíční zásobu živin i v těch nejnáročnějších povětrnostních a půdních podmínkách.

Výhody

- \\ Složení NPK s vysokým obsahem draslíku pro zvýšení výnosů
- \\ S přidavkem vápníku
- \\ Přídavek hořčíku zvyšuje tvorbu chlorofylu a podporuje fotosyntézu

Návod k použití

- 1 Agromaster lze aplikovat rozhozem, do řádku či lokalizovaně na jedno místo.
- 2 Zapravte do půdy do hloubky 5 až 10 cm.
- 3 Je-li instalovaný systém kapkové závlahy, aplikujte Agromaster do blízkosti kapačů.
- 4 Doporučujeme po aplikaci zavlažit.
- 5 Skladujte v suchu.
- 6 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.

Dávkování

Plodiny

Dávkování

Zelenina pěstovaná na poli

Rajčata, paprika a lilek	400-800 kg/ha
--------------------------	---------------

Okurka, cuketa, meloun a vodní meloun	400-800 kg/ha
---------------------------------------	---------------

Cibule, česnek	400-800 kg/ha
----------------	---------------

Mrkev a další kořenová zelenina	400-800 kg/ha
---------------------------------	---------------

Ledový salát	400-800 kg/ha
--------------	---------------

Drobné ovoce pěstované v půdě

Jahody	400-800 kg/ha
--------	---------------

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.