



Greenmaster[®] Liquid

Spring & Summer

Dokonalý poměr živin pro růst

14 | 5 | 7 | TE
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	14%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	0.9%
	Močovinový dusík (N-Urea)	13.1%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	5%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	5%
K ₂ O	Oxid draselný	7%
	vodorozpustný (K ₂ O)	5.7%
B	Bór	0.012%
	vodorozpustný (B)	0.012%
Cu	Měď	0.006%
	vodorozpustná (Cu)	0.006%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.006%
Mn	Mangan	0.012%
	vodorozpustný (Mn)	0.012%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.012%
Mo	Molybden	0.004%
	vodorozpustný (Mo)	0.004%
Zn	Zinek	0.006%
	vodorozpustný (Zn)	0.006%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.006%

Popis

Greenmaster Liquid Spring & Summer je ideální k použití v obdobích největšího růstu. Obsahuje kompletní NPK, které umožňuje výživu v průběhu hlavní sezóny, aniž by docházelo k nadbytečnému růstu. Rovněž doplňuje ztráty živin způsobené sečením trávníku a zpřístupňuje železo vázané v půdě, čímž přispívá k lepšímu zbarvení a zdravému růstu. Úplný komplex stopových má pozitivní vliv na celkovou kondici trávníku a regeneraci po zátěži.

Výhody

- \\ Ideální v obdobích největšího růstu
- \\ Kompletní NPK hnojivo pro výživu v hlavní sezóně
- \\ Úplný komplex stopových prvků
- \\ Nedochází k nadbytečnému růstu; zpřístupněním železa v půdě podporuje barvu a zdraví
- \\ Doplňuje ztráty živin způsobené sečením trávníku
- \\ Přispívá k regeneraci po zátěži

Návod k použití

- 1 Pro zajištění optimálního příjmu listy neaplikujte při vysokých teplotách a slunečném počasí. Vyhněte se aplikaci za sucha a mrazu.
- 2 Produkty Greenmaster Liquid lze mísit v nádrži s dalšími produkty z téže řady s výjimkou produktu Ca-Booster. Lze také mísit se smáčedly H2Pro.
- 3 Množství vody použité k aplikaci produktu ovlivňuje způsob příjmu živin rostlinou. Při použití menšího množství vody (400l/ha) je více živin přijímáno listy, při použití většího množství vody (1000l/ha) je více živin přijímáno kořeny.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Doporučenou dávku 40-120 l/ha (4-12 l/1000m²) smíchejte s 400 – 1000 l/ha vody (40-100 l/1000m²)

Doporučená dávka: 40 - 120 L/ha

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.