



Mg-7

Hořčík a síra pro bohatý růst

0 | 0 | 0 | 7 | 14
N P2O5 K2O MgO SO3



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	0%
P2O5	Oxid fosforečný	0%
K2O	Oxid draselný	0%
MgO	Oxid hořečnatý	7%
	vodorozpustný (MgO)	7.0%
SO3	Oxid sírový	14%
	vodorozpustný (SO ₃)	14%

Popis

Flecotec® Mg-7 je tekuté hnojivo primárně určené k nápravě nedostatků síry a hořčíku. Vysoký obsah hořčíku podpoří fotosyntézu a množství síry optimalizuje příjem všech živin. Flecotec Mg-7 lze používat v ekologickém zemědělství v souladu s nařízením Rady (ES) 2018/848.

Výhody

- \\ Bohatý na hořčík pro lepší fotosyntézu
- \\ Bohatý na síru pro zvýšení syntézy aminokyselin
- \\ Lze použít v ekologickém zemědělství v souladu s nařízením Rady (ES) 2018/848.

Návod k použití

- 1 Používejte Flecotec® Mg-7 k prevenci a nápravě nedostatku síry a hořčíku u všech typů plodin. Používejte pouze v případě potřeby.
- 2 Nepřekračujte doporučenou dávku.
- 3 Přestože můžete tento produkt míchat s většinou běžně používaných hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, měli byste před aplikací vždy provést test kompatibility.
- 4 Nepoužívejte při vysokých teplotách.
- 5 Nemíchejte s oleji nebo produkty na bázi vápníku.
- 6 Skladujte v suchu při teplotě 5-30 °C.
- 7 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Dávkování

Ekologické zemědělství	Přípravek Flecotec® Mg-7 aplikujte pouze v případě nedostatku hořčíku nebo pro prevenci, a to v dávce 20-30 l/ha na aplikaci.
Intenzivní zemědělství	Aplikujte 150-250 l/ha na jeden vegetační cyklus. Rozložte do několika aplikací podle specifických potřeb plodin.
Postřik na list	K odstranění nedostatku hořčíku (hořečnaté chlorózy) aplikujte 5-10 cm ³ /l vody (0,5-1 l/hl) a každých deset dní aplikaci opakujte.

Tyto doporučené dávky jsou pouze orientační, protože podmínky pro pěstování se mohou lišit v závislosti na pěstovaném druhu, odrůdě, závlahové vodě, půdě, klimatu a celkové kondici plodin. Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.