



Organ AA

Aminokyseliny na požádání

6 | 0 | 0
N P2O5 K2O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	6%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	2.6%
	Dusík v organické formě	3.4%
P2O5	Oxid fosforečný	0%
K2O	Oxid draselný	0%

Popis

Bílkoviny jsou nezbytnou součástí každé zdravé stravy... a vaše plodiny nejsou výjimkou. Flecotec® Organ AA je dokonalým řešením pro případný nedostatek rostlinných aminokyselin. Toto organické hnojivo obsahuje 12 % volných aminokyselin, což znamená, že můžete svým rostlinám poskytnout základní složku pro všestranně vyvážený a zdravý růst. Vyrobeno z vysoce kvalitního geneticky nemodifikovaného rostlinného materiálu a podrobeno různým fermentačním procesům. Flecotec lze používat v ekologickém zemědělství v souladu s nařízením Rady (ES) 2018/848.

Výhody

- \\ Bohaté na aminokyseliny
- \\ Přírodní zdroj dusíku
- \\ Lze použít v ekologickém zemědělství v souladu s nařízením Rady (ES) 2018/848.

Návod k použití

- 1 Doporučuje se používat Flecotec® Organ AA na počátku rašení poupat, před květem a ve fázi nasazování a růstu plodů.
- 2 Skladujte v suchu při teplotě 5-30 °C.
- 3 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Dávkování

Fertigace	Aplikujte fertigací v dávce 15-20 l/ha na aplikaci, aplikujte třikrát až čtyřikrát za vegetační cyklus.
	V případě stresu způsobeného intenzivním chladem, poškozením krupobitím, suchem nebo asfyxií kořenů nezapomeňte aplikovat dvakrát týdně v dávce 5-10 litrů na hektar a aplikaci provádět minimálně dva po sobě jdoucí týdny.
Listová aplikace: ovocné stromy (kromě švestek) a vinná réva.	150-200 ml/hl
Foliar application: olive	250-300 ml/hl
Listová aplikace: okrasné zahradnictví	150-200 ml/hl

Tyto doporučené dávky jsou pouze orientační, protože podmínky pro pěstování se mohou lišit v závislosti na pěstovaném druhu, odrůdě, závlahové vodě, půdě, klimatu a celkové kondici plodin. Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.