



Agroblen®

18-5-11+2MgO

Dopřejte svým rostlinám to nejlepší

18 | 5 | 11 | 2.0
N P2O5 K2O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	18%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	7.5%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	8.4%
	Močovinový dusík (N-Urea)	2.1%
P2O5	Oxid fosforečný	5%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	3.7%
K2O	Oxid draselný	11%
	vodorozpustný (K ₂ O)	11.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%

Popis

Sklízejte plody své práce s hnojivem Agroblen® 18-5-11+2MgO | 3-4M, hnojivem s řízeným uvolňováním speciálně navrženým pro výživu jahod a drobného ovoce. Plně obalované NPK hnojivo s vysokým obsahem dusíku a přidaným hořčíkem zajišťuje rychlý růst a efektivní zakořenění rostlin. Díky patentované technologii uvolňování živin Resin se vaše rostliny mohou těšit z trvalého a spolehlivého uvolňování živin po dobu 3-4 měsíců. Stálá dodávka živin zajistí dokonale vyrovnaný růst.

Výhody

- \\ Vyvážený obsah NPK, základní hnojivo s řízeným uvolňováním ideální pro drobné ovoce
- \\ Vysoký obsah dusíku podporuje růst
- \\ Navrženo speciálně pro pěstování jahod s "frigo" sazenicemi.

Návod k použití

- 1 Aplikujte buď do řádků nebo rozmetáním. Při rozmetání nezapravujte produkt hlouběji než 10 cm. Doporučuje se aplikace v oblasti kořenů; nikdy přímo pod rostlinu.
- 2 Zálivka významně zlepšuje působení produktu. Dle možností aplikujte Agroblen přímo pod kapač.
- 3 Nikdy neaplikujte dříve než 1-2 týdny před výsadbou. Nepoužívejte způsob aplikace, který by poškodil obaly granulí drcením či jiným způsobem.
- 4 Skladujte v suchu.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Plodiny	Dávkování
Jahody:	12-15 g/rostlinu u plodin pěstovaných na poli (při 30 000 rostlinách/ha)
Jahody:	3-4 g/rostlinu u plodin pěstovaných na poli v záhonech (při 100 000 rostlinách/ha)
Ostatní drobné ovoce:	300-450 kg/ha, aplikace do řádku
Další vhodné plodiny:	300-600 kg/ha

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.