



Agromaster®

16-8-16+5MgO+16SO₃

Měsíce výživy za všech podmínek

16 | 8 | 16 | 5.0 | 16.0
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	16%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	1.2%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	3.0%
	Močovinový dusík (N-Urea)	11.8%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	8%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6.0%
K ₂ O	Oxid draselný	16%
	vodorozpustný (K ₂ O)	16.0%
MgO	Oxid hořečnatý	5.0%
SO ₃	Oxid sírový	16.0%

Popis

Agromaster® 16-8-16+5MgO+16SO₃ | 5-6M je určen zejména pro plodiny s delší dobou kultivace, protože uvolňuje živiny po dobu 5 - 6 měsíců při průměrné teplotě půdy 21 °C. Ideální je pro lokální aplikace nebo aplikace do řádku u plodin jako jsou okurky, rajčata, papriky nebo lilek na polích. Obsahuje vyvážený poměr dusíku a draslíku, takže rostliny porostou stabilně a rovnoměrně. Navíc obsahuje extra dávku hořčíku pro lepší fotosyntézu a síry pro lepší příjem dusíku. Kombinace technologií E-Max a Resin Release zajišťuje mimořádně účinné uvolňování živin a minimalizaci jejich ztrát, takže vaše rostliny z nich budou mít větší užitek.

Výhody

- \\ Dokonale vyvážený poměr N / K podporuje harmonický vývoj rostliny.
- \\ Hnojivo s nízkým obsahem chloru, na bázi síranu draselného
- \\ Poskytuje okamžitě dostupný fosfor pro stimulaci vývoje kořenů.

Návod k použití

- 1 Agromaster lze aplikovat rozhozem, do řádku či lokalizovaně na jedno místo.
- 2 Zapravte do půdy do hloubky 5 až 10 cm.
- 3 Je-li instalovaný systém kapkové závlahy, aplikujte Agromaster do blízkosti kapačů.
- 4 Skladujte v suchu.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Plodiny

Dávkování

Rajčata, paprika, lilek, okurka

400-800 kg/ha

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.