



Osmocote[®] Topdress

Topdress FT 4-5M

Nejlepší řešení pro aplikace na povrch substrátu

22 | 5 | 6 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	22%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	4.8%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	5.9%
	Močovinový dusík (N-Urea)	11.3%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	5%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	3.7%
K ₂ O	Oxid draselný	6%
	vodorozpustný (K ₂ O)	6.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%
	vodorozpustný (MgO)	1.0%
Cu	Měď	0.050%
Fe	Železo	0.80%
Mn	Mangan	0.30%
Zn	Zinek	0.100%

Popis

Osmocote Topdress FT 4-5M je obalované hnojivo, které je vyvinuto speciálně pro hnojení na povrch substrátu v kontejnerech ve školkách. Obsahuje zvláštní složku, díky které hnojivo po aplikaci ulpívá na povrchu substrátu a nedochází ke ztrátám granulí, když nádoby převrhne vítr nebo při neopatrné zálivce.

Výhody

- \\ Dusík a fosfor s rychlým i řízeným uvolňováním
- \\ Přídavek stopových prvků pro lepší barvu rostlin
- \\ Převrhne-li kontejnery vítr, nedochází ke ztrátě granulí

Návod k použití

- 1 U citlivých rostlin doporučené dávky snižte.
- 2 Přípravek aplikujte pouze na povrch substrátu. V případě použití kapkové závlahy umístěte přípravek pod kapače.
- 3 Tento výrobek není určen ke vmíchávání do substrátů.
- 4 Výrobky Topdress nelze používat se zavlažovacími systémy přliv/odliv.
- 5 Skladujte v suchu.
- 6 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.

Dávkování

	Kontejnery < 10 litrů	Kontejnery > 10 litrů
Kontejnerové školky	2 – 4 g/l	1 g/l pro každý litr objemu navíc*

*Příklad Celková dávka v případě kontejneru s obsahem 50 litrů: 3 g/l pro prvních 10 litrů = 30 gramů 1 g/l na dalších 40 litrů = 40 gramů Celkem = 30 + 40 = 70 gramů na 50 l kontejner Upozornění Snižte doporučené dávkování pro rostliny citlivé na zasolení. Produkt aplikujte pouze na povrch substrátu. V případě kapkové závlahy aplikujte hnojivo přímo pod kapkovač. Tento produkt není určený pro mísení do substrátu ani pro aplikaci do sázecí jamky. Tento produkt není určený pro náplavové závlahové systémy. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL. Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.