



**Osmocote®
Exact**
High K

High K 3-4M

Více draslíku pro kompaktní rostliny

12 | 8 | 19 | 1.8 | 21.2 | TE
N P2O5 K2O MgO SO3



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	12%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	5.1%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	6.9%
P2O5	Oxid fosforečný	8%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6.0%
K2O	Oxid draselný	19%
	vodorozpustný (K ₂ O)	19.0%
MgO	Oxid hořečnatý	1.8%
SO3	Oxid sírový	21.2%
B	Bór	0.018%
	vodorozpustný (B)	0.016%
Cu	Měď	0.060%
	vodorozpustná (Cu)	0.047%
Fe	Železo	0.35%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.07%
Mn	Mangan	0.050%
Mo	Molybden	0.01%
	vodorozpustný (Mo)	0.018%
Zn	Zinek	0.021%
	vodorozpustný (Zn)	0.014%

Popis

Osmocote® Exact High K 3-4M je ideální pro hrnkové rostliny, které vyžadují výživu s vysokým obsahem draslíku po dobu 3 až 4 měsíců a u kterých je důležitý kompaktní růst, jako jsou rostliny rodu cyclamen nebo primula.

Osmocote Exact High K lze dále kombinovat s vodorozpustnými hnojivy Peters. Osmocote Exact High K lze použít v kombinaci s produktem Osmocote CalMag, je-li třeba přidavek vápníku nebo hořčíku (např. v podmínkách s měkkou vodou). Lze použít i v případech, kdy má závlahová voda vysoký obsah dusíku. U rostlin s vysokými nároky na železo lze tento produkt kombinovat s hnojivem Osmocote Iron.

Výhody

- Živiny se uvolňují po dobu 3 až 4 měsíců
- vyšší obsah draslíku a nízký obsah fosforu zajišťují kompaktní růst, hnojivo je proto ideální pro hrnkové, záhonové rostliny a trvalky;
- zdravý rozvoj kořenového systému díky vysoce účinné dodávce živin
- komplex stopových prvků a optimální dodávka železa zajišťují listy s dokonalým zbarvením a leskem;

Návod k použití

- 1 Dobu působení hnojiva Osmocote Exact High K ovlivňuje teplota. (Doba působení produktu se uvádí při teplotě 21° C): 16°C 21°C 26°C 4-5M 3-4M 2-3M.
- 2 Skladujte v suchu.
- 3 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Určení:	Dávka v g/l
Kontejnerové školky	2-3 g/l 3-4 g/l
Hrnkové rostliny	2-3 g/l 2.5-4 g/l
Balkonové a záhonové rostliny	2-3 g/l 2.5-4 g/l
Trvalky	1.5-2 g/l 2.5-4 g/l

Důležité upozornění: Přidejte maximálně 0,5 g/l startovacího NPK hnojiva v kombinaci s produktem Osmocote Exact High K. Dávkování hnojiva Osmocote se řídí objemem nádob. V případě přesazování do větších kontejnerů je nutné vyrovnat zředění substrátu zvýšenou dávkou čerstvého pěstebního média. Konkrétní doporučení konzultujte s naším technickým poradcem. Výše uvedené dávky se doporučují pro nehnosené substráty. Jedná se pouze o obecné doporučení. Dávkování je třeba upravit pro specifické podmínky jako je pěstování v tunelech, sklenících a v případech specifických klimatických podmínek. Podrobnější doporučení žádejte od našeho technického poradce. Každou změnu dávkování, způsobu aplikace a jiných kultivačních zásahů napřed vždy vyzkoušejte na malém vzorku. Protože pěstební podmínky se mohou lišit a společnost ICL nemůže ovlivnit aplikaci produktů, není ani odpovědná za případné negativní výsledky.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.