



Osmocote® Pro

High K 8-9M

 Pro správné větvení a kompaktní růst

11

N

11

P₂O₅

19

K₂O

2.0

MgO

TE

Popis

Osmocote® Pro High K 5-6M je skvělý pro hrnkové rostliny, které potřebují výživu s vysokým obsahem draslíku, nebo v situacích, kdy má závlahová voda vysoký obsah dusíku. Díky svému složení bohatému na NPK, hořčík a stopové prvky je navržen tak, aby vašim rostlinám pomohl dosáhnout dobrého větvení a kompaktního růstu. Pryskyřičný obal zajišťuje stabilní přísun živin po předem stanovenou dobu 8 až 9 měsíců.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	11%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	3.8%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	6.2%
	Močovinový dusík (N-Urea)	1%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	11%



	vodorozpustný (P_2O_5)	8.8%
K_2O	Oxid draselný vodorozpustný (K_2O)	19% 19%
MgO	Oxid hořečnatý vodorozpustný (MgO)	2% 1%
B	Bór vodorozpustný (B)	0.01% 0.01%
Cu	Měď vodorozpustná (Cu)	0.045% 0.035%
Fe	Železo Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.2% 0.04%
Mn	Mangan	0.027%
Mo	Molybden vodorozpustný (Mo)	0.01% 0.01%
Zn	Zinek vodorozpustný (Zn)	0.012% 0.008%

Výhody

- 🔹 Vysoký obsah stopových prvků
- 🔹 Lze kombinovat s vodorozpustnými hnojivy.
- 🔹 Extra draslík pro kompaktní růst
- 🔹 Zaručená doba působení a složení

Dávkování



	Nízká dávka hnojiva	Průměrná dávka hnojiva	Vysoká dávka hnojiva
Kontejnerové školky	2-2.5 g/l	3-3.5 g/l	4-4.5 g/l
Hrnkové rostliny	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Záhonové rostliny / Letničky	2-3 g/l	3-4.5 g/l	4.5-5 g/l

Upozornění

V kombinaci s Osmocote Pro, přidávejte maximálně 0,5g/l startovacího NPK hnojiva. Dávky jsou uvedeny v gramech na litr objemu nádoby, jedná se o plné dávky.

Tyto dávky jsou obecným doporučením a počítají se substráty bez předchozího hnojení. Výše zmíněná doporučení jsou pouze obecná. Specifické situace jako jsou skleníky, tunely nebo specifické klimatické podmínky, vyžadují konkrétní doporučení. Další informace a doporučení týkající se použití např. ve fóliovnících a sklenících získáte u svého poradce společnosti ICL.

Změnu dávkování, způsobu aplikace či jiné změny nejprve vyzkoušejte na menší ploše. Vzhledem k různým pěstebním podmínkám a ke skutečnosti, že aplikace produktů je mimo kontrolu společnosti, ICL nemůže být zodpovědná za žádné negativní výsledky.

Návod k použití

- 1 Produkt se doporučuje mísit s pěstebním médiem. Při aplikaci do sázecí jamky, konzultujte konkrétní situaci se zástupcem společnosti ICL
- 2 Osmocote Pro lze používat v kombinaci s vodorozpustnými hnojivy.
- 3 Doba působení hnojiva Osmocote ovlivňuje teplota (doba působení produktu se určuje při 21° C): 16° C: 10-11 months 21° C: 8-9 months 26° C: 6-7 months.
- 4 Pro citlivé rostliny doporučujeme použít Osmocote Exact
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Skladujte v suchu.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.



<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/ornamental-horticulture/products/osmocote-pro-high-k-8-9m/>
: 14/05/2024