



# Landscaper Pro<sup>®</sup>

## Spring & Summer

 Ať to roste

20 | 0 | 7 | 9 | 3.0  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O CaO MgO

### Popis

Vysoce účinné hnojivo pro hlavní růstovou fázi

### Složení

#### Oxidy

|                               |                                  |     |
|-------------------------------|----------------------------------|-----|
| N                             | Celkový dusík                    | 20% |
|                               | Močovinový dusík (N-Urea)        | 20% |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Oxid fosforečný                  | 0%  |
| K <sub>2</sub> O              | Oxid draselný                    | 7%  |
|                               | vodorozpustný (K <sub>2</sub> O) | 7%  |
| CaO                           | Oxid vápenatý                    | 9%  |

|  |                     |    |
|--|---------------------|----|
|  | vodorozpustný (CaO) | 7% |
|--|---------------------|----|

|     |                     |      |
|-----|---------------------|------|
| MgO | Oxid hořečnatý      | 3%   |
|     | vodorozpustný (MgO) | 2.5% |

## Výhody



- \\ Výborný poměr cena/výkon
- \\ Nepřetržité uvolňování živin po dobu 2-3 měsíců
- \\ Optimální přísun živin pro zlepšení kvality trávníku

## Dávkování

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Doporučená dávka: | 25 - 35 g/m <sup>2</sup> |
|-------------------|--------------------------|

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

## Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypání na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Skladujte v suchu.

Doporučené použití

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |



Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/landscaper-pro-spring-summer/>  
: 12/05/2024