

T

Fertigace pro pěstování rajčat a paprik

15 | 8 | 25 | 3.5 | 8.7 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO SO₃



Složení

oxide		
N	Celkový dusík	15%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	10.0%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	5.0%
	Močovinový dusík (N-Urea)	0%
	Dusík v organické formě	0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	8%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	8.0%
K ₂ O	Oxid draselný	25%
	vodorozpustný (K ₂ O)	25.0%
MgO	Oxid hořečnatý	3.5%
	vodorozpustný (MgO)	3.5%
SO ₃	Oxid sírový	8.7%
	vodorozpustný (SO ₃)	8.7%
B	Bór	0.02%
	vodorozpustný (B)	0.02%
Cu	Měď	0.003%
	vodorozpustná (Cu)	0.003%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0%
Fe	Železo	0.07%
	vodorozpustné (Fe)	0.07%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.03%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0%
	Železo (Fe) jako EDDHA chelát	0.04%
Mn	Mangan	0.04%
	vodorozpustný (Mn)	0.04%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0%
Mo	Molybden	0.004%
	vodorozpustný (Mo)	0.004%
Zn	Zinek	0.025%
	vodorozpustný (Zn)	0.025%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0%

Popis

Terraflex T je tradiční vodorozpustné hnojivo s přidavkem hořčíku. Je speciálně navrženo k hnojení závlaze zeleniny, najde využití především při pěstování rajčat a paprik. Fertigace pomocí hnojiv Terraflex dodá veškeré živiny bez rizika hromadění sulfátů nebo chlóru. Terraflex zaručuje trvale udržitelné vysoké výnosy bez rizika zasolení. Všechny kovové stopové prvky jsou v podobě EDTA chelátů, což zaručuje jejich účinný příjem. Železo je přítomno v jedinečné podobě EDDHA chelátu, díky čemuž je dostupné i ve vodě a v půdách s vysokým pH.

Výhody

- \\ Sypký, jemně krystalický prášek, který se rychle a úplně rozpouští ve vodě.
- \\ Všechny kovové stopové prvky jsou v podobě EDTA chelátů. Železo je ve formě EDDHA chelátu, což zaručuje jeho dostupnost i při vyšších hodnotách pH.
- \\ Neobsahuje močovinu, vysoký obsah nitrátového dusíku zaručuje optimální příjem kationtů a asimilaci dusíku.
- \\ Lze použít v průběhu celého pěstebního cyklu jednotlivých plodin.

Návod k použití

- 1 Skladujte v suchu.
- 2 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 3 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Obecné dávkování:

40-60 kg/ha týdně

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.