



Ficote[®] Total

8-9M

 Dlouhá doba působení pro dlouhotrvající růst a výsledky

17 | 9 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Popis

Ficote[®] Total je určen k použití jako základní hnojivo a můžete jej kombinovat s dalším vodorozpustným hnojivem. Obsahuje jak všechny stopové prvky, které vaše rostliny budou potřebovat tak 100% obalené NPK. Prakticky u něj nedochází ke ztrátám živin vymýváním. Je to dokonalý produkt pro profesionální pěstitele, kteří pro své okrasné rostliny potřebují dobré základní hnojivo.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	17%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	7.6%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	9.4%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	9%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6.6%



K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	11% 11%
MgO	Oxid hořečnatý vodorozpustný (MgO)	2% 1.3%
B	Bór vodorozpustný (B)	0.013% 0.011%
Cu	Měď vodorozpustná (Cu)	0.032% 0.02%
Fe	Železo Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.25% 0.05%
Mn	Mangan vodorozpustný (Mn)	0.03% 0.035%
Mo	Molybden vodorozpustný (Mo)	0.012% 0.012%
Zn	Zinek vodorozpustný (Zn)	0.015% 0.01%

Výhody

- 🔹 Ideální pro základní hnojení
- 🔹 Dlouhá doba působení a skvělý poměr cena/výkon
- 🔹 100 % obalovaný NPK a všechny základní stopové prvky

Dávkování

Kontejnerové školky

Nízká dávka: 2-2,5 g/l

Normální dávka: 3-3,5 g/l

Vysoká dávka: 4-4,5 g/l



Důležité upozornění:

Výše uvedené dávky se doporučují pro nehnojené substráty. Jedná se pouze o obecné doporučení. Dávkování je třeba upravit pro specifické podmínky jako je pěstování v tunelech, sklenících a v případech specifických klimatických podmínek. Podrobnější doporučení žádejte od našeho technického poradce.

Každou změnu dávkování, způsobu aplikace a jiných kultivačních zásahů napřed vždy vyzkoušejte na malém vzorku. Protože pěstební podmínky se mohou lišit a společnost ICL nemůže ovlivnit aplikaci produktů, není ani odpovědná za případné negativní výsledky.

Návod k použití

- 1 Ficote® Total je určen k základnímu hnojení a lze jej kombinovat s vodorozpustným hnojivem.
- 2 V obtížných pěstebních podmínkách doporučujeme spíše Osmocote® Exact.
- 3 Dobu působení hnojiva ovlivňuje teplota. (Doba působení produktu se uvádí při teplotě 21° C) 16° C: 10-11 months 21° C: 8-9 months 26° C: 6-7 months.
- 4 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 5 Skladujte v suchu.
- 6 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/ornamental-horticulture/products/ficote-total-8-9m-2/>
: 13/05/2024

ICL Growing Solutions Česko a Slovensko

