



Osmocote® Bloom

Bloom 2-3M

Volba pro záhonové rostliny v malých kontejnerech

13 | 7 | 18 | 20.7 | TE
N P2O5 K2O SO3



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	13%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	5.2%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	6.9%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	0.9%
P2O5	Oxid fosforečný	7%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	5.0%
K2O	Oxid draselný	18%
	vodorozpustný (K ₂ O)	18.0%
SO3	Oxid sírový	20.7%
B	Bór	0.018%
	vodorozpustný (B)	0.016%
Cu	Měď	0.052%
	vodorozpustná (Cu)	0.052%
Fe	Železo	0.35%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.07%
Mn	Mangan	0.050%
Mo	Molybden	0.017%
	vodorozpustný (Mo)	0.012%
Zn	Zinek	0.021%

Popis

Osmocote Bloom je speciálně vyvinuté hnojivo s řízeným uvolňováním živin určené pro záhonové květiny a květiny pěstované v malých kontejnerech. Je určeno ke zvýšení kvality rostliny prostřednictvím maximální dodávky živin v průběhu celého pěstebního cyklu, přes prodej a první fáze pěstování u zákazníka. Osmocote Bloom představuje výjimečně udržitelný způsob pěstování záhonových rostlin s minimálními ztrátami živin vymýváním a optimálním využitím hnojiva. Rostliny jsou vyživovány od začátku až do konce - od fáze hrnkování až po dodání k zákazníkovi. Osmocote Bloom má takový obsah NPK, který se ideálně hodí pro záhonové květiny, které mají pěstební cyklus dlouhý přibližně 2-3 měsíce. Tento poměr NPK je zejména účinný k zajištění kompaktního růstu rostlin.

Výhody

- \\ Poměr NPK 2:1:3 se dokonale hodí pro kompaktní růst záhonových květin
- \\ Mini-granule jsou ideální pro míchání do malých kontejnerů a sadbovačů
- \\ Při aplikaci plné dávky není potřeba přidávat další hnojiva v kapalně formě

Návod k použití

- 1 Díky unikátní technologii polymerového obalu vyvinuté společností ICL Specialty Fertilizers vykazuje hnojivo Osmocote Bloom velmi plynulý průběh uvolňování živin.
- 2 Je určeno zejména pro záhonové rostliny s délkou pěstování mezi 6 týdnů až 3 měsíci. Osmocote Bloom je vhodný zejména pro záhonové a hrnkové rostliny s krátkou dobou kultivace.
- 3 Pro rostliny s delší dobou kultivace doporučujeme použít Osmocote Exact High K 3-4M nebo 5-6M.
- 4 Dobu působení hnojiva Osmocote Bloom ovlivňuje teplota. (Doba působení produktu se uvádí při teplotě 21° C) 16°C: 3-4M 21°C: 2-3M 26°C: 1.5-2M.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Skladujte v suchu.
- 7 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

	Nízká dávka hnojiva	Průměrná dávka hnojiva	Vysoká dávka hnojiva
Rostliny/letničky	1.5-2 g/l	2-3 g/l	3-4.5 g/l

Upozornění Toto dávkování počítá s nehnojenými substráty. Pokud však aplikujete startovací hnojivo, nedoporučujeme v kombinaci s výše uvedenými dávkami používat jej více než 0,5 kg/m³. Hnojivo Osmocote Bloom je primárně určeno pro mísení se substrátem, nedoporučuje se pro aplikaci do jamky. Ve zvláštních případech může být nutné přihnojení kapalným hnojivem nebo úprava hnojení v závislosti na kvalitě používané vody. Podrobnější informace získáte u svého poradce společnosti ICL Specialty Fertilizers. Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL SF odpovědná za žádné negativní výsledky.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.