



Osmocote[®]
Exact
Standard

Standard High K 8-9M

Dodejte hrnkovým rostlinám vytoužený draslík

11 | 11 | 18 | TE
N P2O5 K2O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	11%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	4.3%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	6.7%
P2O5	Oxid fosforečný	11%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	8.2%
K2O	Oxid draselný	18%
	vodorozpustný (K ₂ O)	18.0%
B	Bór	0.01%
	vodorozpustný (B)	0.01%
Cu	Měď	0.050%
	vodorozpustná (Cu)	0.031%
Fe	Železo	0.25%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.05%
Mn	Mangan	0.03%
	vodorozpustný (Mn)	0.02%
Mo	Molybden	0.010%
	vodorozpustný (Mo)	0.007%
Zn	Zinek	0.010%

Popis

Osmocote Exact Standard High K 8-9M patří ke třetí generaci hnojiv Osmocote s řízeným uvolňováním živin. Jedná se o hnojivo, které v sobě kombinuje stálou kvalitu a spolehlivost s uvolňováním živin dle předem určeného vzorce a navíc ještě obsahuje přídavek draslíku. Zejména vhodné pro hrnkové a záhonové rostliny, trvalky a všude tam, kde je třeba kompaktní růst Osmocote Exact High K lze dále kombinovat s vodorozpustnými hnojivy Peters.

Výhody

- \\ Ideální pro hrnkové rostliny, s o něco delší dobou uvolňování živin než Osmocote[®] Exact Standard High K 5-6M.
- \\ Bezpečné: řízené uvolňování a vysoký obsah všech základních stopových prvků
- \\ Stálost: každá výrobní šarže je stejná
- \\ Uvolňování živin dle předem daného vzorce zajistí kvalitnější rostliny

Návod k použití

- 1 Dobu působení hnojiva Osmocote ovlivňuje teplota. (Doba působení produktu se uvádí při teplotě 21° C) 16°C: 10-11M 21°C: 8-9M 26°C: 6-7M.
- 2 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 3 Skladujte v suchu.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

	Nízká dávka hnojiva	Průměrná dávka hnojiva	Vysoká dávka hnojiva
Kontejnerové školky	2-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Hrnkové rostliny	2-4 g/l	4-5 g/l	4-6 g/l
Trvalky	1.5-3 g/l	2.5-3.5 g/l	3-4 g/l

Upozornění Výše uvedené dávky jsou pouze obecným doporučením a počítají se substráty bez předchozího hnojení. Pro specifické podmínky (skleníky, tunely, zvláštní klimatické podmínky) je třeba dávkování upravit. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL. Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL SF odpovědná za žádné negativní výsledky.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.