



**Osmocote<sup>®</sup>**  
**Exact**  
Standard

Standard 3-4M

 Efektivní výživa pro krátké pěstební cykly

16 | 9 | 12 | 2.0 | TE  
N | P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> | K<sub>2</sub>O | MgO

## Popis

Osmocote Exact Standard 3-4M je zejména vhodný pro později hrnkované rostliny, které mají dobrý růstový potenciál a krátký pěstební cyklus. Vynikající kvalita převyšuje běžný standard v oboru. Navíc, část granulí je barevně označena - snadno lze určit dobu působení produktu.

## Složení

### Oxidy

|                               |                                                |      |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------|
| N                             | Celkový dusík                                  | 16%  |
|                               | Dusičnanový dusík (N-NO <sub>3</sub> )         | 7%   |
|                               | Amoniakální dusík (N-NH <sub>4</sub> )         | 9%   |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Oxid fosforečný                                | 9%   |
|                               | vodorozpustný (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 6.7% |
| K <sub>2</sub> O              | Oxid draselný                                  | 12%  |



|     |                                        |                        |
|-----|----------------------------------------|------------------------|
|     | vodorozpustný (K <sub>2</sub> O)       | 12%                    |
| MgO | Oxid hořečnatý<br>vodorozpustný (MgO)  | <b>2%</b><br>1.3%      |
| B   | Bór<br>vodorozpustný (B)               | <b>0.02%</b><br>0.02%  |
| Cu  | Měď<br>vodorozpustná (Cu)              | <b>0.05%</b><br>0.031% |
| Fe  | Železo<br>Železo (Fe) jako EDTA chelát | <b>0.45%</b><br>0.09%  |
| Mn  | Mangan                                 | <b>0.06%</b>           |
| Mo  | Molybden<br>vodorozpustný (Mo)         | <b>0.02%</b><br>0.014% |
| Zn  | Zinek                                  | <b>0.015%</b>          |

## Výhody

- Živiny se uvolňují po dobu 3 až 4 měsíců - ideální pro rostliny s krátkým pěstebním cyklem
- Bezpečné: řízené uvolňování a vysoký obsah všech základních stopových prvků
- Produkt má stálé složení, každé balení zajistí stejný výsledek
- K dispozici jsou různé vzorce uvolňování živin dle potřeb konkrétních rostlin

## Dávkování

Nízká dávka hnojiva

Průměrná dávka hnojiva

Vysoká dávka hnojiva

|                              |         |             |             |
|------------------------------|---------|-------------|-------------|
| Kontejnerové školky          | 1-2 g/l | 1.5-2.5 g/l | 2.5-3.5 g/l |
| Hrnkové rostliny             | 1-2 g/l | 2-3 g/l     | 3-4 g/l     |
| Záhonové rostliny / Letničky | 1-2 g/l | 2-3 g/l     | 3-4 g/l     |



#### Upozornění

Tyto dávky jsou obecným doporučením a počítají se substráty bez předchozího hnojení. Další informace a doporučení týkající se použití např. ve fóliovnících a sklenících získáte u svého poradce společnosti ICL Specialty Fertilizers.

Změnu dávkování, aplikace či jinou změnu vždy nejprve vyzkoušejte na malé ploše. Vzhledem k rozdílným podmínkám a skutečnosti, že aplikaci našich produktů nemůžeme jakkoliv ovlivnit, nemůže být společnost ICL Specialty Fertilizers zodpovědná za žádné negativní výsledky.

## Návod k použití

- 1 Dobu působení hnojiva Osmocote ovlivňuje teplota. (Doba působení se určuje při teplotě 21°C) 16°C: 4-5M 21°C: 3-4M 26°C: 2-3M.
- 2 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 3 Skladujte v suchu.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

## Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-standard-3-4m/>  
: 12/05/2024