



Osmocote[®]
Exact
Standard

Standard 5-6M

Nejbezpečnější Osmocote - výživa pro hrnkové rostliny po dobu 5 až 6 měsíců

15 | 9 | 12 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	15%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	6.4%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	8.6%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	9%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6.5%
K ₂ O	Oxid draselný	12%
	vodorozpustný (K ₂ O)	12.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%
	vodorozpustný (MgO)	1.3%
B	Bór	0.024%
	vodorozpustný (B)	0.022%
Cu	Měď	0.060%
	vodorozpustná (Cu)	0.047%
Fe	Železo	0.47%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.09%
Mn	Mangan	0.065%
Mo	Molybden	0.024%
	vodorozpustný (Mo)	0.024%
Zn	Zinek	0.028%
	vodorozpustný (Zn)	0.019%

Popis

Osmocote Exact Standard 5-6M je zejména vhodný pro hrnkované rostliny. Hnojivo s řízeným uvolňováním živin obsahuje veškeré nezbytné stopové prvky. Vynikající kvalita převyšuje běžný standard v oboru. Navíc, část granulí je barevně označena - snadno lze určit dobu působení produktu.

Výhody

- \\ Hnojivo s řízeným uvolňováním živin obsahující veškeré nezbytné stopové prvky
- \\ Bezpečné: řízené uvolňování a vysoký obsah všech základních stopových prvků
- \\ Produkt má stálé složení, každé balení zajistí stejný výsledek
- \\ K dispozici jsou různé vzorce uvolňování živin dle potřeb konkrétních rostlin

Návod k použití

- 1 Dobu působení hnojiva Osmocote ovlivňuje teplota. (Doba působení se určuje při teplotě 21°C) 16°C: 5-7M 21°C: 5-6M 26°C: 4-5M.
- 2 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 3 Skladujte v suchu.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

	Nízká dávka hnojiva	Průměrná dávka hnojiva	Vysoká dávka hnojiva
Kontejnerové školky	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l
Hrnkové rostliny	2-3 g/l	3-4 g/l	4-5 g/l

Upozornění Tyto dávky jsou obecným doporučením a počítají se substráty bez předchozího hnojení. Další informace a doporučení týkající se použití např. ve fóliovnících a sklenících získáte u svého poradce společnosti ICL Specialty Fertilizers. Změnu dávkování, aplikace či jinou změnu vždy nejprve vyzkoušejte na malé ploše. Vzhledem k rozdílným podmínkám a skutečnosti, že aplikaci našich produktů nemůžeme jakkoliv ovlivnit, nemůže být společnost ICL Specialty Fertilizers zodpovědná za žádné negativní výsledky.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.