



Osmocote[®]
Exact
Standard

Lo.Start 16-18M

 Dopřejte pomale rostoucím rostlinám ten nejlepší start do života

15 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Popis

Osmocote[®] Exact Lo.Start 16-18M je určen speciálně pro pomalu rostoucí jehličnany a rostliny citlivé na zasolení. Ideální je pro situace, kdy je vyžadován pomalý start, jako je pomalé zakořeňování mladých rostlin a časně pěstování v tunelech. Osmocote Exact Lo.Start 16-18M je vhodný i pro teplé klima.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	15%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	6.6%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	8.4%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	8%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6%
K ₂ O	Oxid draselný	11%



	vodorozpustný (K ₂ O)	11%
MgO	Oxid hořečnatý vodorozpustný (MgO)	2% 1.3%
B	Bór vodorozpustný (B)	0.02% 0.02%
Cu	Měď vodorozpustná (Cu)	0.05% 0.031%
Fe	Železo Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.45% 0.09%
Mn	Mangan	0.06%
Mo	Molybden vodorozpustný (Mo)	0.02% 0.014%
Zn	Zinek	0.015%

Výhody

- Zejména vhodné pro hrnkové a záhonové rostliny, trvalky a všude tam, kde je třeba kompaktní růst
- Bezpečné: řízené uvolňování a vysoký obsah všech základních stopových prvků
- Stálost: každá výrobní šarže je stejná
- Uvolňování živin dle předem daného vzorce zajistí kvalitnější rostliny

Dávkování

Nízká dávka hnojiva

Průměrná dávka hnojiva

Vysoká dávka hnojiva

Kontejnerové školky	4-6 g/l	6-8 g/l	8-10 g/l
Hrnkové rostliny	3-5 g/l	4-6 g/l	5-7 g/l

Upozornění



Výše uvedené dávky jsou pouze obecným doporučením a počítají se substráty bez předchozího hnojení. Pro specifické podmínky (skleníky, tunely, zvláštní klimatické podmínky) je třeba dávkování upravit. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL SF odpovědná za žádné negativní výsledky.

Návod k použití

- 1 Dobu působení hnojiva Osmocote Exact Lo.Start 16-18M ovlivňuje teplota. (Doba působení produktu se uvádí při teplotě 21° C) 16°C: 20-22M 21°C: 16-18M 26°C: 12-14M.
- 2 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 3 Skladujte v suchu.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-standard-lo-start-16-18m/>
: 12/05/2024