



Osmocote[®]
Exact
Mini

Mini 3-4M

Jemné granule pro aplikaci do nádob s malým objemem

15 | 9 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	15%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	6.6%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	8.4%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	9%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6.7%
K ₂ O	Oxid draselný	11%
	vodorozpustný (K ₂ O)	11.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%
	vodorozpustný (MgO)	1.3%
B	Bór	0.02%
	vodorozpustný (B)	0.02%
Cu	Měď	0.050%
	vodorozpustná (Cu)	0.031%
Fe	Železo	0.45%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.09%
Mn	Mangan	0.06%
Mo	Molybden	0.020%
	vodorozpustný (Mo)	0.014%
Zn	Zinek	0.015%

Popis

Osmocote[®] Exact Mini 3-4 M obsahuje jemné granule, které jsou ideální pro aplikaci do nádob s malým objemem. Snadno se aplikuje buď přimícháním do substrátu, nebo později na povrch. Je speciálně vyvinutý pro malé objemy substrátu od 20 ml, takže je ideální pro nádoby menší než 8 cm v průměru. Osmocote Exact Mini je 100% obalovaný a 100% bezpečný pro rostliny.

Výhody

- \\ Komplettní balíček stopových prvků a hořčíku
- \\ Rovnoměrný růst rostlin díky vynikajícímu rozptýlení granulí
- \\ Všechny živiny v každé granulí

Návod k použití

- 1 Dobu působení hnojiva Osmocote ovlivňuje teplota. (Doba působení produktu se uvádí při teplotě 21° C) 16°C: 4-5M 21°C: 3-4M 26°C: 2-3M.
- 2 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 3 Skladujte v suchu.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

	Zamícháno do substrátu	Aplikace na povrch substrátu
Balkonové a záhonové rostliny	1.5-2 g/l	40-60 g/m ²
Mladé rostliny	2-3 g/l	50-70 g/m ²
Rychle rostoucí řízky	1.5-2 g/l	30-50 g/m ²
Mini hrnkové rostliny	1.5-2.5 g/l	30-50 g/m ²
Řízky v lesních školkách	1-2 g/l	30-50 g/m ²
Semenáče v lesních školkách, druhy klíčící do 2 měsíců	1-2 g/l	30-50 g/m ²
Řízky v okrasných školkách	1-2 g/l	30-50 g/m ²

Důležité upozornění: Výše uvedené dávky se doporučují pro nehnojené substráty. Jedná se pouze o obecné doporučení. Dávkování je třeba upravit pro specifické podmínky jako je pěstování v tunelech, sklenících a v případech specifických klimatických podmínek. Produkt se nedoporučuje při přepichování a/nebo podzimní/zimní přesazování. Podrobnější doporučení žádejte od našeho technického poradce. Každou změnu dávkování, způsobu aplikace a jiných kultivačních zásahů napřed vždy vyzkoušejte na malém vzorku. Protože pěstební podmínky se mohou lišit a společnost ICL Specialty Fertilizers nemůže ovlivnit aplikaci produktů, není ani odpovědná za případné negativní výsledky.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.