

Osmocote®
Exact
Mini

Mini 5-6M

Snadné, přesné a spolehlivé dávkování živin po dobu 5 až 6 měsíců pro malé kontejnery.

15 | 9 | 11 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Popis

Osmocote® Exact Mini 3-4 M obsahuje jemné granule, které jsou ideální pro aplikaci do nádob s malým objemem. Snadno se aplikuje buď přimícháním do substrátu, nebo později na povrch. Je speciálně vyvinutý pro malé objemy substrátu od 20 ml, takže je ideální pro nádoby menší než 8 cm v průměru. Osmocote Exact Mini je 100% obalovaný a 100% bezpečný pro rostliny.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	15%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	6.6%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	8.4%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	9%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6.7%



K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	11% 11%
MgO	Oxid hořečnatý vodorozpustný (MgO)	2% 1.3%
B	Bór vodorozpustný (B)	0.02% 0.02%
Cu	Měď vodorozpustná (Cu)	0.05% 0.031%
Fe	Železo Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.45% 0.09%
Mn	Mangan	0.06%
Mo	Molybden vodorozpustný (Mo)	0.02% 0.014%
Zn	Zinek	0.015%

Výhody

- 🔹 Komplettní balíček stopových prvků a hořčíku
- 🔹 Rovnoměrný růst rostlin díky vynikajícímu rozptýlení granulí
- 🔹 Všechny živiny v každé granuli

Dávkování



	Zamícháno do substrátu	Aplikace na povrch substrátu
Rychle rostoucí řízký	2-2.25 g/l	50-70 g/m ²
Mini hrnkové rostliny	2-3 g/l	50-70 g/m ²
Řízky v lesních školkách	1.5-2.5 g/l	50-70 g/m ²
Semenáče v lesních školkách, druhy klíčící do 2 měsíců	1.5-2.5 g/l	50-70 g/m ²
Řízky v okrasných školkách	1.5-2.5 g/l	50-70 g/m ²

Důležité upozornění:

Výše uvedené dávky se doporučují pro nehnojené substráty. Jedná se pouze o obecné doporučení. Dávkování je třeba upravit pro specifické podmínky jako je pěstování v tunelech, sklenících a v případech specifických klimatických podmínek. Produkt se nedoporučuje při přepichování a/nebo podzimní/zimní přesazování. Podrobnější doporučení žádejte od našeho technického poradce.

Každou změnu dávkování, způsobu aplikace a jiných kultivačních zásahů napřed vždy vyzkoušejte na malém vzorku. Protože pěstební podmínky se mohou lišit a společnost ICL Specialty Fertilizers nemůže ovlivnit aplikaci produktů, není ani odpovědná za případné negativní výsledky.

Návod k použití

- 1 Dobu působení hnojiva Osmocote ovlivňuje teplota. (Doba působení produktu se uvádí při teplotě 21°C) 16°C: 4-5M 21°C: 5-6M 26°C: 2-3M.
- 2 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 3 Skladujte v suchu.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-mini-mini-5-6m/>
: 12/05/2024

ICL Growing Solutions Česko a Slovensko

