



Osmocote[®]
Exact
Protect

Protect 12-14M

 Celoroční výživa citlivých rostlin ve školkách

14 | 8 | 11 | 2.0 | TE
N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Popis

Osmocote Exact Protect byl speciálně vyvinut pro podzimní hrnkování v kontejnerových školkách v období od poloviny října do poloviny ledna. Aplikace hnojiva Osmocote Exact Protect 12-14M je zejména vhodná pro konifery a růže, prostokořenný rostlinný materiál / řízkovaný materiál při podzimním/zimním hrnkování. Osmocote Exact Protect 12-14M může být míchán do substrátu nebo aplikován do sázecí jamky. Aplikace do sázecí jamky je doporučena pouze u dobře zakořeněných rostlin. Pro dávkování použijte aplikátor, který nepoškodí obal hnojiva.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	14%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	6.2%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	7.8%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	8%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	6%



K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	11% 11%
MgO	Oxid hořečnatý vodorozpustný (MgO)	2% 1.3%
B	Bór vodorozpustný (B)	0.02% 0.02%
Cu	Měď vodorozpustná (Cu)	0.045% 0.028%
Fe	Železo Železo (Fe) jako EDTA chelát	0.42% 0.08%
Mn	Mangan	0.06%
Mo	Molybden vodorozpustný (Mo)	0.02% 0.014%
Zn	Zinek	0.015%

Výhody

- Je možná aplikace plné dávky na podzim - přihnojení na jaře již není nutné.
- Lepší růst díky účinnému a načasovanému uvolňování živin.
- Úspora pracovní síly v průběhu obchodně náročné jarní sezóny.

Dávkování

Nízká dávka hnojiva

Průměrná dávka hnojiva

Vysoká dávka hnojiva

Kontejnerové školky

3-4 g/l

4-5 g/l

5-6 g/l

Upozornění

Tyto dávky jsou obecným doporučením a počítají se substráty, které obsahují max. 0,5 kg/m³ základního hnojiva. Pro většinu rostlin není základní hnojení potřeba. Další informace získáte u svého poradce společnosti ICL.



Osmocote Exact Protect může být míchán do substrátu nebo aplikován do sázecí jamky. Aplikace do sázecí jamky je doporučena pouze u dobře zakořeněných rostlin. Pro dávkování použijte aplikátor, který nepoškodí obal hnojiva.

Osmocote Exact Protect je 100 % hnojivo s druhým obalem, kde je uvolňování živin odloženo o 4-6 týdnů. Je velmi důležité aplikovat Osmocote Exact Protect ve správném období. Kontaktujte svého poradce pro konkrétní doporučení.

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky.

Návod k použití

- 1 Dobu působení hnojiva Osmocote ovlivňuje teplota. (Doba působení produktu se uvádí při teplotě 21°C) 16°C: 15-17M 21°C: 12-14M 26°C: 9-11M.
- 2 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 3 Skladujte v suchu.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/ornamental-horticulture/products/osmocote-exact-protect-protect-12-14m/>
: 13/05/2024