



Sierraform[®] GT

Anti-Stress

Netřeba se stresovat

15 | 0 | 26 | TE
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	15%
	Močovinový dusík (N-Urea)	7.2%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	7.8%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%
K ₂ O	Oxid draselný	26%
	vodorozpustný (K ₂ O)	26.0%
Fe	Železo	1.00%

Popis

Sierraform[®] GT Anti-Stress pomáhá vašemu trávníku překonat stres a udržuje ho ve špičkové kondici. Vysoký obsah draslíku je ideální v létě nebo na podzim na plochách s drobným trávníkem. Dusík s pomalým uvolňováním podporuje růst po dobu 6-8 týdnů a minimalizuje růstové výkyvy. Jeho jednosložkové mikrogranule jsou vybaveny našimi speciálními patentovanými technologiemi obalování MU2 a SiLK.

Výhody

- \\ Ideální pro použití jako přípravné hnojivo před obdobím zátěže
- \\ Pomalé uvolňování N (MU) pro konzistentní a trvalou reakci trávníku
- \\ Bez obsahu P pro situace kdy je fosforu již dostatek
- \\ Rovnoměrné rozptýl i při nízkých aplikačních dávkách

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Pokud během 1 – 2 dní po aplikaci nezaprší, hnojivo zalijte. Závlaha napomáhá lepšímu rozptýlení granulí a na velmi nízko sečených trávnicích minimalizuje riziko, že granule posbírá sekačka. Zálivka po aplikaci rovněž omezí viditelnost stop obsluhy. Vyvarujte se použití za mrazu a sucha.
- 2 Odložte operace jako vertikutace a/nebo grooming až na 3. den po aplikaci; umožní to řádné rozptýlení granulí. Uvolňování dusíku je výrazně omezeno při teplotách půdy pod 10°C.
- 3 Pokud se produkt vysype na chodník, beton apod., ujistěte se, že dojde k okamžitému odstranění, jinak hrozí nežádoucí odbarvení povrchu.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Doporučené dávkování:

20 – 30 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.