



## Sierrablen® Plus

Spring starter 4-5M

Vyrazte už časně z jara!

24 | 5 | 8 | 2.0  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O MgO



## Složení

| Oxidy                         |                                                |       |
|-------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| N                             | Celkový dusík                                  | 24%   |
|                               | Dusičnanový dusík (N-NO <sub>3</sub> )         | 5.4%  |
|                               | Amoniakální dusík (N-NH <sub>4</sub> )         | 6.3%  |
|                               | Močovinový dusík (N-Urea)                      | 12.3% |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Oxid fosforečný                                | 5%    |
|                               | vodorozpustný (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) | 3.7%  |
| K <sub>2</sub> O              | Oxid draselný                                  | 8%    |
|                               | vodorozpustný (K <sub>2</sub> O)               | 8.0%  |
| MgO                           | Oxid hořečnatý                                 | 2.0%  |

## Popis

Začněte vegetační sezónu s hnojivem Sierrablen® Plus Spring Starter. Je vybaveno patentovanými technologiemi Poly-S a PACE, a poskytne vašemu trávníku veškeré živiny po dobu 4-5 měsíců. Díky vysokému obsahu dusíku zajistíte rychlou reakci i v chladnějších podmínkách a umožníte tak vašemu trávníku vstoupit do jara ve zdraví. Kombinace dvou technologií Poly-S a PACE zajišťuje stálou výživu, lepší dobu působení a nízké riziko popálení. Hnojiva Sierrablen Plus mají malé granule, takže umožní rovnoměrné pokrytí povrchu a vyrovnanou distribuci živin. SierrablenPlus je nejlepší volba, která zajistí trávníku rychlý a zdravý růst s dlouhotrvajícími účinky.

## Výhody

- \\ Ideální jako první hnojivo s řízeným uvolňováním v sezóně
- \\ Vysoký obsah dusíku pro rychlou reakci i při nižších teplotách
- \\ Zajišťuje zdravý růst na začátku sezóny

## Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypaní na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Skladujte v suchu.

## Doporučené použití

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

## Dávkování

---

Průměrná doporučená dávka:

37.5 g/m<sup>2</sup>

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

## Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.