



Sierrablen®

22-6-11

Vítěz celé sezóny

22 | 6 | 11 | TE
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	22%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	3.8%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	4.9%
	Močovinový dusík (N-Urea)	13.3%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	6%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	4.5%
K ₂ O	Oxid draselný	11%
	vodorozpustný (K ₂ O)	11.0%
Cu	Měď	0.010%
Mo	Molybden	0.002%

Popis

S hnojivem Sierrablen® 22-6-11 můžete vyřešit celou sezónu najednou. Hnojivo s řízeným uvolňováním živin s dobou působení 8-9 měsíců obsahuje dostatek živin k zajištění plynulého růstu rostlin po celou aktivní sezónu vašeho trávníku. Sierrablen lze rovněž použít v malých dávkách jako základní výživu a je kompatibilní i s dalšími hnojivy. Přídavek železa pozitivně ovlivňuje zbarvení trávníku.

Výhody

- \\ V případě potřeby lze kombinovat s dalšími živinami
- \\ Vyvážené NPK s pomalým uvolňováním a přidaným dusíkem s rychlým uvolňováním
- \\ Napomáhá přípravě rostliny na období zátěže

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypaní na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
- 5 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 6 Skladujte v suchu.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Průměrná doporučená dávka:

50 g/m²

Doporučená dávka:

40.00 – 60.00 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.