



Sierrablen®

27-5-5-Fe

Jedna aplikace pro celoroční růst

27 | 5 | 5 | TE
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	27%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	4.0%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	5.0%
	Močovinový dusík (N-Urea)	18.0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	5%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	3.7%
K ₂ O	Oxid draselný	5%
	vodorozpustný (K ₂ O)	5.0%
Fe	Železo	0.50%

Popis

Travníkové hnojivo s dobou působení 8-9 měsíců. Uvolňuje živiny v optimálních dávkách v průběhu jednotlivých fází růstu a pozitivně ovlivňuje celkový výkon trávníku.

Technologie řízeného uvolňování živin předchází ztrátě živin vymýváním a zajišťuje dlouhodobý účinek bez zbytečných výkyvů v růstu. Poskytuje dostatek živin na celou hlavní sezónu, a to pouze v jediné aplikaci. Přídavek železa pozitivně ovlivňuje zbarvení trávníku.

Výhody

- \\ Výživa na celou sezónu pouze v jediné aplikaci
- \\ Napomáhá přípravě trávníku na období zátěže
- \\ Rychle se uvolňující dusík a přidané železo pro okamžitou viditelnou odezvu

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypaní na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.
- 5 Obsahuje železo.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Průměrná doporučená dávka:	32.5 g/m ²
----------------------------	-----------------------

Doporučená dávka:	40.00 – 60.00 g/m ²
-------------------	--------------------------------

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.