



Agroleaf[®] Power

Calcium

Dodejte ovoci a zelenině extra vápník

12 | 5 | 19 | 9.0 | 2.5 | TE
N P2O5 K2O CaO MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	12%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	11.6%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	0.4%
P2O5	Oxid fosforečný	5%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	5.0%
K2O	Oxid draselný	19%
	vodorozpustný (K ₂ O)	19.0%
CaO	Oxid vápenatý	9.0%
	vodorozpustný (CaO)	9.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.5%
	vodorozpustný (MgO)	2.5%
B	Bór	0.043%
	vodorozpustný (B)	0.043%
Cu	Měď	0.034%
	vodorozpustná (Cu)	0.034%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.034%
Fe	Železo	0.27%
	vodorozpustné (Fe)	0.27%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0.27%
Mn	Mangan	0.13%
	vodorozpustný (Mn)	0.13%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.13%
Mo	Molybden	0.020%
	vodorozpustný (Mo)	0.020%
Zn	Zinek	0.034%
	vodorozpustný (Zn)	0.034%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.034%

Charakteristika

Popis

Produkt zpevňuje buněčné stěny a obsahuje vysoké množství draslíku, který zvětšuje velikost plodů. Vynikající příjem produktu listy prodlužuje dostupnost stopových prvků. Zároveň předchází praskání ovoce a prodlužuje dobu jeho skladovatelnosti. Agroleaf Power Calcium se vyrábí z nejčistších surovin, které se rychle a kompletně rozpouští. V některých případech jsou výsledky pozorovatelné do 24 hodin od aplikace. Nejvhodnější je aplikace v období vývoje plodů ovoce a zeleniny.

Výhody

- \\ předchází a napravuje nedostatky vápníku
- \\ nejvhodnější je aplikace v období vývoje plodů
- \\ zpevňuje buněčné stěny
- \\ vyšší obsah draslíku zvětšuje velikost plodů
- \\ zdokonalený příjem listy prodlužuje dostupnost stopových prvků
- \\ chrání ovoce před popraskáním a prodlužuje jeho skladovatelnost
- \\ uvolňuje stres rostlin

Návod k použití

- 1 Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.
- 2 Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřik před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.
- 3 Vyhněte se postřiku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Použití	Dávka
Venku	3-5 kg / 200-1000l vody
Skleníky	0,3% roztok

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.