



Micromax®

TE Mix

S hnojivem Micromax® nebude vašim rostlinám nic chybět.

0 | 0 | 0 | TE
N P2O5 K2O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	0%
P2O5	Oxid fosforečný	0%
K2O	Oxid draselný	0%
B	Bór	0.70%
	vodorozpustný (B)	0.70%
Cu	Měď	0.500%
	vodorozpustná (Cu)	0.500%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.500%
Fe	Železo	7.80%
	vodorozpustné (Fe)	7.80%
	Železo (Fe) jako EDTA chelát	5.40%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	2.40%
Mn	Mangan	2.60%
	vodorozpustný (Mn)	2.60%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	2.60%
Mo	Molybden	0.320%
	vodorozpustný (Mo)	0.320%
Zn	Zinek	1.300%
	vodorozpustný (Zn)	1.300%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	1.300%

Popis

Tato směs stopových prvků je výjimečná. Obsahuje všechny hlavní prvky, které vás napadnou. Nevhodné podmínky nebo špatné počasí mohou často znamenat ztrátu živin, ale ne v tomto případě - všechny kationtové prvky jsou v chelátové formě, takže jsou pro vaše rostliny až pětikrát lépe dostupné. Pečlivě vyvážený obsah základních stopových prvků vás ochrání před jejich nedostatkem a podpoří vývoj kořenů i zdravý růst rostlin. Micromax® WS TE obsahuje také X3, biostimulátor, který zlepšuje vstřebávání a příjem živin. Navíc je 100% rozpustný ve vodě, což umožňuje rychlou a jednoduchou přípravu.

Výhody

- \\ Vyvážené složení základních stopových prvků
- \\ Silnější kořeny pro podporu zdravého růstu
- \\ Umožňuje rychlý příjem živin

Charakteristika

Návod k použití

- 1 MicroMax® WS TE je špičkový produkt, který lze snadno a bezpečně používat v zemědělství a zahradnictví.
- 2 Ačkoli hlavní aplikační metodou je fertigace, lze přípravek aplikovat i postřikem na list.
- 3 Výrobek skladujte na chladném, suchém a větraném místě.
- 4 Pokud potřebujete další informace, obraťte se na našeho technického poradce.

Dávkování

Doporučené dávky

Květiny a zelenina	Preventivně: aplikovat 1-2 kg/ha v rané fázi po zakořenění rostlin, ve fázi 4-6 listů.
	Korektivně: Začněte při prvních příznacích nedostatku stopových prvků, aplikujte 1-2 kg/ha a další 2 postřiky v intervalu 2-3 týdnů.
Listnaté stromy a keře	Preventivně: aplikujte 3-6 kg/ha brzy na jaře, jakmile mají stromy dostatek listů, aby mohly postřik absorbovat.
	Korektivně: začít při nasazení plodů dávkou 3-6 kg/ha. Sledujte příznaky nedostatku stopových prvků a okamžitě reagujte aplikací 2-3 dalších postřiků v intervalu 2-3 týdnů.

Před změnou dávky, aplikace nebo jiných proměnných proveďte nejprve zkoušku v malém měřítku. Vzhledem k tomu, že okolnosti se mohou lišit a aplikace našich výrobků je mimo naši kontrolu, společnost ICL nemůže nést odpovědnost za případné nepříznivé výsledky.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.