



Peters[®] Professional

Blossom Booster

Nádherné kvetení: čím více poupat, tím lépe!

10 | 30.0 | 20.0 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	10%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	5.2%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	4.8%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	30.0%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	30.0%
K ₂ O	Oxid draselný	20.0%
	vodorozpustný (K ₂ O)	20.0%
MgO	Oxid hořečnatý	2.0%
	vodorozpustný (MgO)	2.0%
B	Bór	0.020%
	vodorozpustný (B)	0.020%
Cu	Měď	0.015%
	vodorozpustná (Cu)	0.015%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.015%
Fe	Železo	0.120%
	vodorozpustné (Fe)	0.120%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0.120%
Mn	Mangan	0.060%
	vodorozpustný (Mn)	0.060%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.060%
Mo	Molybden	0.010%
	vodorozpustný (Mo)	0.010%
Zn	Zinek	0.015%
	vodorozpustný (Zn)	0.015%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.015%

Popis

Blossom Booster je hnojivo s klasickým, ale stále účinným složením. Díky vysokému obsahu fosforu a poměru N:K 1:2 je Blossom Booster ideálním produktem pro podporu tvorby poupat a kvetení. A Nechybí ani unikátní chelatační technologie M-77, která napomáhá rychlejšímu příjmu živin a lepšímu účinku v cílových orgánech a tkáních.

Výhody

- Speciální složení na podporu tvorby a vývoje pupenů
- Malé, snadno rozpustné granule
- Vaše rostliny budou po aplikaci rychle reagovat

Charakteristika

Návod k použití

- 1 Nejlépe je připravit si zásobní roztok 1-2 hodiny před použitím, dobře promíchat nebo použít teplou vodu, aby se přípravek Peters® Excel Blossom Booster zcela rozpustil.
- 2 Nemíchejte tento výrobek s přípravkem Peters® Excel.
- 3 Částečně použité nebo poškozené obaly bezpečně uzavřete.
- 4 Skladujte v suchu.
- 5 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.