



Osmoform®

NXT

Posuňte své rostliny na vyšší úroveň

22 | 5 | 11 | 2.0 | TE

N | P₂O₅ | K₂O | MgO

Popis

Osmoform NXT je založen na nové technologii granulace SILK (na bázi oxidu křemičitého), která obsahuje dusík a draslík s pomalým uvolňováním. Pomalu se uvolňující K je uložen v trojrozměrné matici, která se v průběhu času pomalu rozpouští. Osmoform obsahuje NPK, hořčík a balíček stopových prvků. Složení dusíku je vyvážené tak, aby rostliny po aplikaci rychle reagovaly s následným dlouhotrvajícím účinkem. Osmoform NXT obsahuje granule o velikosti 1,2 - 2,8 mm.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	22%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	2.9%
	Močovinový dusík (N-Urea)	7.6%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	11.5%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	5%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	4%



K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	11% 11%
MgO	Oxid hořečnatý	2%
Cu	Měď	0.02%
Fe	Železo	0.5%
Mn	Mangan	0.1%
Mo	Molybden	0.001%
Zn	Zinek	0.02%

Výhody

- \\ Granule výborně přilnou k pěstebnímu médiu
- \\ Rychlá reakce rostlin a efekt ozelenění
- \\ Jednoduchá aplikace

Dávkování

	Nízká dávka hnojiva	Průměrná dávka hnojiva	Vysoká dávka hnojiva
Kontejnerové školky	1 g/l	2 g/l	3 g/l

Důležité upozornění:

Použít max. 5–6 g na jedno místo. U větších květináčů/kontejnerů přípravek rozdělte. Nepoužitý přípravek nenechávejte v aplikátorech.

Dávky je třeba upravit pro konkrétní složení pěstebního substrátu, druh rostliny a systém pěstování. Pro kompletní výživu doporučujeme dodatečné přihnojení přípravkem Osmocote® Exact nebo vodorozpustným hnojivem.

Každou změnu dávkování, způsobu aplikace a jiných kultivačních zásahů napřed vždy vyzkoušejte na malém vzorku. Protože pěstební podmínky se mohou lišit a společnost ICL nemůže ovlivnit aplikaci produktů, není ani odpovědná za případné negativní výsledky.

Návod k použití



- 1 Dusík a draslík se uvolňují po dobu přibližně 8-10 týdnů po aplikaci.
- 2 Při hnojení je důležité, abyste hnojivo rovnoměrně rozprostřeli po povrchu pěstebního substrátu. Po aplikaci odstraňte případné granule z listů.
- 3 Nespotřebované nebo poškozené pytle je nutné pečlivě uzavřít.
- 4 Skladujte v suchu.
- 5 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/ornamental-horticulture/products/osmoform-nxt/>
: 12/05/2024