



Sportsmaster® WSF

High N

Flexibilní vodorozpustné řešení

35 | 0 | 14
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	35%
	Dusičnanový dusík (N-NO ₃)	4.3%
	Močovinový dusík (N-Urea)	30.7%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%
K ₂ O	Oxid draselný	14%
	vodorozpustný (K ₂ O)	14.0%

Charakteristika

Popis

Sportsmaster® WSF High N obsahuje mimořádně velkou dávkou dusíku (z různých zdrojů). Obsahuje také draslík pro odolnější trávník se stabilním, rovnoměrným růstem a železo ve formě chelátů pro sytější zelenou barvu. Ideální pro doplnění dusíku během celého vegetačního cyklu. Sportsmaster® WSF jsou vysoce účinná a dokonale rozpustná hnojiva pro hospodárné ošetření velkých zatravněných ploch. Obsahují technologii TMax, která zlepšuje celkový příjem živin. Příjem živin listy i kořeny je rychlý a účinek je patrný po několika týdnech. Použití vodorozpustných hnojiv je maximálně hospodárné při ošetřování velkých ploch, zejména na golfových hřištích.

Výhody

- \\ Vysoký obsah dusíku zajistí rychlou odezvu
- \\ Silnější, zelenější tráva s vyváženým růstem
- \\ Vhodné kombinovat s hlavním výživovým plánem granulovanými hnojivy

Návod k použití

- 1 Produkty Sportsmaster WSF lze mísit v nádrži s dalšími produkty v rámci téže řady a se smáčedly H2Pro and H2Pro Maximise.
- 2 Aby se zaručilo, že se produkt zcela rozpustí, měly by se všechny produkty mísit přidáním množství potřebného k naplnění poloviny postřikové nádrže a poté 10 - 15 minut míchat. Potom by se nádrž měla doplnit vodou do plného objemu. Teplota vody má vliv na rychlost rozpouštění.
- 3 Pro aplikace na list použijte menší množství vody (300 - 600 l/ha) a vyhněte se aplikaci při vysokých teplotách a slunečném počasí, chcete-li zajistit optimální příjem živin.
- 4 Pro aplikace k příjmu živin kořeny použijte větší množství vody (600 - 1000 l/ha) a ihned po aplikaci 2-3 minuty zavlažujte, abyste zajistili nezbytné množství vody a snížili riziko poškození trávniku.
- 5 Dojde-li k vysypání na chodník, beton, šaty apod., okamžitě odstraňte, produkt může způsobit skvrny
- 6 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Doporučené dávkování:

15 - 60 kg/ha

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.