



Agroleaf[®] Liquid

High K

 Kapalný draslík pro trvalou výživu rostlin

8 | 8 | 16 | TE

N

P₂O₅

K₂O

Popis

Agroleaf Liquid High K je vysoce kvalitní tekutá listová výživa určená k prevenci a/nebo korekci nedostatku draslíku. Produkt je obohacen komplexem stopových prvků ve formě chelátů. Produkt Agroleaf Liquid High K vyniká čistotou a vysokou kvalitou živin, které podporují velikost plodů a mají pozitivní vliv na jejich zbarvení. Jeho účinek ještě zvyšuje technologie F3 SurfActive a specifický komplex stopových prvků ve formě chelátů. Neiontové surfaktanty obsažené v technologii F3 SurfActive jsou přímo odpovědné za účinnost postřiku. HEEDTA chelát železa zvyšuje flexibilitu produktu při použití s postřiky v širším rozmezí pH.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	8%
	Močovinový dusík (N-Urea)	8%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	8%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	8%



K ₂ O	Oxid draselný vodorozpustný (K ₂ O)	16% 16%
B	Bór vodorozpustný (B)	0.02% 0.02%
Cu	Měď vodorozpustná (Cu) Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.002% 0.002% 0.002%
Fe	Železo vodorozpustné (Fe)	0.06% 0.06%
Mn	Mangan vodorozpustný (Mn) Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.03% 0.03% 0.03%
Mo	Molybden vodorozpustný (Mo)	0.002% 0.002%
Zn	Zinek vodorozpustný (Zn) Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.015% 0.015% 0.015%

Výhody

- Upravuje nedostatek draslíku a zabraňuje jeho nedostatku, čímž snižuje stres.
- Obohaceno o chelátované stopové prvky
- Lepší pokrytí, přilnavost a dostupnost živin

Dávkování



Pěstovaná plodina	Dávka a (l/ha)	Mn. vody (l/ha)	Koncentra ce (%)	Aplikace
Plodící zelenina	5-10	300- 600	1.7	Nasazení na plod – sklizeň, 4–5 krát
Saláty, zelí	3-5	300- 600	1	Po vytvoření hlávek, 2–3 krát
Cibule, česnek	3-6	300- 600	1	Při zvětšování cibulí, 1–2 krát
Drobné ovoce, ovocné sady, vinice	5-10	600- 1000	0.8-1	Nasazení na plod – 2 týdny před sklizní, 4–5 krát
Brambory	3-6	250- 300	1.2-2	Růst hlíz, 2–3 krát
Slunečnice	3-6	200- 300	1.5-2	Začátek kvetení
Řepka olejná	3-6	200- 300	1.5-2	Začátek kvetení
Okrasné rostliny	2-3	600- 1000	0.3	Před a po kvetením, 1–2 krát

* Při menším množství vody na hektar použijte nižší dávky a naopak dávky zvyšte, použijete-li větší množství vody.

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

- 1 Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.
- 2 Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřik před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.
- 3 Vyhněte se postřiku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.



Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/agriculture/products/agroleaf-liquid-high-k-5/>
: 12/05/2024