



Greenmaster[®] Liquid

STEP (stopové prvky)



Posuňte trávník o KROK výše

0

N

0

P₂O₅

0

K₂O

TE

Popis

Greenmaster Liquid STEP Liquid lze aplikovat po celý rok, ale nejlépe působí v období aktivního růstu. Je vynikajícím pomocníkem při nápravě nevyvážené výživy trávniku. Greenmaster Liquid STEP Liquid obsahuje cheláty stopových prvků, které maximalizují dodávku živin a zabraňují jejich navázání na půdu. Úplný komplex stopových prvků zlepšuje zdravotní stav trávniku a přispívá k jeho regeneraci po zátěži.

Složení

Oxidy

N	Celkový dusík	0%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	0%
K ₂ O	Oxid draselný	0%



B	Bór	0.231%
	vodorozpustný (B)	0.231%
Cu	Měď	1.154%
	vodorozpustná (Cu)	1.154%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	1.154%
Mn	Mangan	1.731%
	vodorozpustný (Mn)	1.731%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	1.731%
Mo	Molybden	0.115%
	vodorozpustný (Mo)	0.115%
Zn	Zinek	1.154%
	vodorozpustný (Zn)	1.154%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	1.154%

Výhody

- \\ Lze používat po celý rok
- \\ Nejlépe působí v období aktivního růstu
- \\ Napravuje nevyváženou výživu rostlin
- \\ Chaláty stopových prvků maximalizují dodávku živin
- \\ Pozitivně působí proti navázání živin v půdě
- \\ Úplný komplex stopových prvků
- \\ Zlepšuje zdravotní stav trávníku, přispívá k regeneraci po zátěži

Dávkování

Doporučenou dávku 20-60 l/ha (2-6 l/1000m²) smíchejte s 400 – 1000 l/ha vody (40-100 l/1000m²)

Doporučená dávka:

20 - 60 l/ha



Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Návod k použití

- 1 Pro zajištění optimálního příjmu listy neaplikujte při vysokých teplotách a slunečném počasí. Vyhněte se aplikaci za sucha a mrazu.
- 2 Produkty Greenmaster Liquid lze mísit v nádrži s dalšími produkty z téže řady s výjimkou produktu Ca-Booster. Lze také mísit se smáčedly H2Pro.
- 3 Množství vody použité k aplikaci produktu ovlivňuje způsob příjmu živin rostlinou. Při použití menšího množství vody (400l/ha) je více živin přijímáno listy, při použití většího množství vody (1000l/ha) je více živin přijímáno kořeny.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

<https://icl-growingsolutions.com/cs-cz/turf-landscape/products/greenmaster-liquid-step-chelated-trace-elements/>
: 12/05/2024