



Greenmaster[®] Pro-Lite[®]

Autumn Mg

Vaše podzimní hnojivo s hořčíkem

6 | 5 | 11 | 3.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	6%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	1.8%
	Ureaformaldehyde (N-MU)	4.2%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	5%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	4.0%
K ₂ O	Oxid draselný	11%
	vodorozpustný (K ₂ O)	11.0%
MgO	Oxid hořečnatý	3.0%
Fe	Železo	0.50%

Charakteristika

Granule Size 0.5-1.7

Popis

Greenmaster Pro-Lite Autumn zajišťuje dostatek fosforu a draslíku, které podporují tvorbu kořenů a zároveň potlačují slabý růst. Nízký obsah amoniakálního dusíku pozitivně působí na růst rostlin bez výkyvů. Je ideální k použití během podzimu ke zlepšení odolnosti povrchu trávníku nebo jako první granulované hnojivo na začátku nové sezóny. Vzhledem k 6% obsahu železa se musí pěstitelé vyvarovat aplikace v místech, kde roste mech, protože negativně ovlivňuje jeho vzhled. Greenmaster Pro-Lite Autumn posiluje trávník, aby lépe odolával mechanickému poškození a zlepšuje jeho celkovou kondici.

Výhody

- \\ Ideální na podzim nebo jako první granulované hnojivo na začátku sezóny
- \\ Nízký obsah dusíku a vysoký obsah draslíku pomáhají zvyšovat odolnost trávníku
- \\ Pozitivně působí na celkovou kondici nízkého golfového trávníku

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha. Uvolňování dusíku je výrazně omezeno při teplotách půdy pod 10°C.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí. Pokud vástakové ošetření teprve čeká, odložte ho až na 3. den po aplikaci; umožní to řádné rozptýlení granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypaní na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Doporučená dávka: 30-35 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.