



Greenmaster® Pro-Lite®

Cold Start

Nastartování trávníku v chladnějších podmínkách

11 | 5.0 | 5.0 | TE
N P2O5 K2O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	11%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	5.5%
	Močovinový dusík (N-Urea)	5.5%
P2O5	Oxid fosforečný	5.0%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	0.8%
K2O	Oxid draselný	5.0%
	vodorozpustný (K ₂ O)	5.0%
Fe	Železo	8.0%

Popis

Pomozte svému trávníku v chladnějším počasí co nejlépe vykročit do sezóny s hnojivem Greenmaster® Pro-Lite Cold Start - ideálním granulovaným hnojivem pro začátek sezóny. Obsahuje železo pro silnou reakci trávníku bez nadměrného růstu a draslík a fosfor pro rychlý účinek. Výsledky uvidíte do týdne a můžete se z nich těšit až 6 týdnů.

Výhody

- \\ Ideální jako první aplikace granulovaného hnojiva v sezóně pro "nastartování" trávníku i v chladnějších podmínkách
- \\ Oamžitě dostupný fosfor a draslík zajistí rychlou reakci trávníku
- \\ Vysoký obsah železa zajistí silnou reakci trávníku bez nadbytečného růstu

Návod k použití

- 1 Aplikujte na suché listy. Zálivka po aplikaci napomáhá rovnoměrnému rozptýlení, zrychluje počáteční účinek a omezuje stopy po obsluze. Vyhněte se aplikaci za mrazu či sucha. Uvolňování dusíku je výrazně omezeno při teplotách půdy pod 10°C.
- 2 Aplikace by měla probíhat po provzdušňování jako je aerifikace dutými hroty, propichování a/nebo skarifikace, aby nedošlo k poškození granulí. Pokud vástakové ošetření teprve čeká, odložte ho až na 3. den po aplikaci; umožní to řádné rozptýlení granulí.
- 3 Pokud dojde k rozsypaní na chodníky, beton, šaty apod., okamžitě omyjte, protože produkt může způsobit odbarvení.
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Doporučené použití

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dávkování

Doporučená dávka: 30-35 g/m²

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.