



Agroleaf[®] Power

High P

Podpořte rozvoj kořenového systému

12 | 52 | 5 | TE
N P₂O₅ K₂O



Složení

Oxidy		
N	Celkový dusík	12%
	Amoniakální dusík (N-NH ₄)	8.7%
	Močovinnový dusík (N-Urea)	3.3%
P ₂ O ₅	Oxid fosforečný	52%
	vodorozpustný (P ₂ O ₅)	52.0%
K ₂ O	Oxid draselný	5%
	vodorozpustný (K ₂ O)	5.0%
B	Bór	0.03%
	vodorozpustný (B)	0.03%
Cu	Měď	0.070%
	vodorozpustná (Cu)	0.070%
	Měď (Cu) jako EDTA chelát	0.070%
Fe	Železo	0.14%
	vodorozpustné (Fe)	0.14%
	Železo (Fe) jako DTPA chelát	0.14%
Mn	Mangan	0.07%
	vodorozpustný (Mn)	0.07%
	Mangan (Mn) jako EDTA chelát	0.07%
Mo	Molybden	0.001%
	vodorozpustný (Mo)	0.001%
Zn	Zinek	0.070%
	vodorozpustný (Zn)	0.070%
	Zinek (Zn) jako EDTA chelát	0.070%

Charakteristika

Popis

Agroleaf Power High P je přípravek pro listovou výživu určený pro stadium tvorby hlíz u brambor a k podpoře rozvoje kořenového systému u přesazené zeleniny. Podporuje zároveň kvetení a pomáhá předcházet ztrátě výnosů u plodících plodin. Agroleaf Power High P se vyrábí z nejčistších surovin dostupných na trhu. Tato čistota umožňuje kompletní rozpustnost ve studené vodě a přináší rychlou reakci rostlin. Vysoký obsah fosforu je neúčinnější cestou k zajištění přísunu rozpustného fosfátu, který pozitivně ovlivňuje zakořenění přesazených rostlin. Vynikající rozpustnost umožňuje jednoduché mísení v nádrži a eliminuje riziko ucpání postřikového zařízení. Navíc je Agroleaf Power High P kompatibilní s řadou přípravků k ochrannému postřiku rostlin. Agroleaf Power High P se nejlépe hodí k aplikaci na mladé rostliny, u nichž již skončila fáze růstu kořenů a fosfáty již jimi téměř nejsou přijímány.

Návod k použití

- 1 Nejlepší doba pro postřik je pozdě odpoledne nebo večer. Aplikujte vysokým tlakem.
- 2 Lze mísit s mnoha fungicidy/insekticidy. Při mísení s dalšími chemikáliemi postřik před použitím na velké ploše nejdříve vyzkoušejte. Vyčkejte 2-3 dny na reakci.
- 3 Vyhněte se postřiku za nevhodných povětrnostních podmínek. (např. ostré slunce, pravé poledne s vysokými teplotami, období se silným výparem).
- 4 Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Dávkování

Použití	Dávka
Venku	3-5 kg / 200-1000l vody
Skleníky	0,3% roztok

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.

Upozornění

Než provedete změnu dávkování, aplikace či jinou změnu, vyzkoušejte ji nejprve na malém vzorku. Vzhledem k různým podmínkám a nemožnosti ovlivnit vlastní aplikaci, nemůže být společnost ICL odpovědná za žádné negativní výsledky. Konkrétní doporučení získáte u svého regionálního manažera společnosti ICL.