Agroleaf® Liquid

Moly B

Premium-Flüssigdünger mit Bor und Molybdän

4	16	4
N	P2O5	K2O

Garantierte Analyse

Oxid		
N	Gesamtstickstoff (N)	4%
	Ammoniumstickstoff (N-NH4)	2.6%
	Carbamidstickstoff (N-Ur)	1.4%
P2O5	Phosphorpentoxid	16%
	Wasserlösliches (P2O5)	16%
K2O	Kaliumoxid	4%
	Wasserlösliches (K2O)	4%
B	Bor	0.1%
	Wasserlösliches (B)	0.1%
Mo	Molybdän	2.00%
	Wasserlösliches (Mo)	2.00%

Produktbeschreibung

Agroleaf® Liquid Moly B ist ein hochwertiger flüssiger NPK-Blattdünger, angereichert mit Bor und hochkonzentriertem Molybdän. Das Produkt wurde für Kulturen mit hohem Bedarf an diesen Spurennährstoffen entwickelt und bietet eine schnelle Lösung, um etwaige Mängel zu beheben. Agroleaf® Liquid Moly B basiert auf der F3 SurfActive-Technologie von ICL, die die Effizienz der Blattdüngung auf drei Arten erhöht: Durch die Senkung der Oberflächenspannung der Gießwassertropfen wird eine bessere Benetzung, Haftung und Retention erreicht, wodurch sich die Nährstoffe besser über das Blatt verteilen. Außerdem werden mehr Nährstoffe zurückgehalten, anstatt herunterzulaufen oder abzuprallen. Darüber hinaus ermöglicht die F3-Technologie die Bildung kleiner Nährstoffdepots auf der Blattoberfläche, die nach einer Wiederbefeuchtung reaktiviert werden, wodurch die Nährstoffnutzungseffizienz zusätzlich gesteigert wird.

Vorteile

- behebt und verhindert Bor- und Molybdänmangel
- geeignet für zahlreiche unterschiedliche Kulturen
- bessere Verteilung, Haftung und Rückhaltung

Anwendungshinweise

1. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere ICL Fachberater.

Aufwandmengen

Kulturempfehlungen	Dosierung* L/ha	Wasservolumen L/ha	Konz. (%)	Zeitpunkt
Fruchtgemüse, Kartoffeln	0.5-1	300-600 250-300	0.2 0.2-0.3	Während des gesamten Kulturzyklus. Im Freiland – nach Schließen des Bestandes
Hülsenfrüchte (Sojabohnen)	1-2	300	0.3-0.7	Ab 6 Laubblättern
Kohl, Blumenkohl, Brokkoli	1-3	300-600	0.3-0.5	Ab 6-8 Laubblättern, 2-3 Mal
Raps	0.5-1 1-2	200-300	0.25-0.5 0.3-0.7	Im Herbst; im Frühjahr bis zur Blüte, 2 Mal
Sonnenblumen	1-3	200-300	0.5-1	Bei 4-6 Laubblättern
Zuckerrüben	1-3	250-400	0.4-0.8	Bei 6-8 Laubblättern
Grünland	0.5-1	200-300	0.25-0.3	Während des gesamten Kulturzyklus, 2-3 Mal

* Verwenden Sie niedrigere Dosierungen bei geringerer Wassermenge/ha und höhere Dosierungen, wenn die Wassermenge erhöht wird. Düngen Sie zuerst eine kleine Fläche, bevor Sie die Dosierung oder andere Variablen ändern. Da die Gegebenheiten unterschiedlich sein können und die Anwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegt, kann ICL nicht für nachteilige Ergebnisse verantwortlich gemacht werden.

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.