Agroleaf® Liquid

Iron

Beseitigt Eisenmangel bei Feldfrüchten

0 | 0 | 0 | TE

N P2O5 K2O

Garantierte Analyse

Oxid		
N	Gesamtstickstoff (N)	0%
P2O5	Phosphorpentoxid	0%
K2O	Kaliumoxid	0%
Fe	Eisen	4.400%
	Wasserlösliches (Fe)	4.400%
	EDTA-Chelat	4.400%

Produktbeschreibung

Agroleaf® Liquid Iron verhindert und behebt Eisenmangel. Dieser Premium-Blattdünger in flüssiger Form wurde für Feldfrüchten formuliert, insbesondere für Beerenobst und den Weinbau. Das Produkt basiert auf der F3 SurfActive-Technologie von ICL, die die Effizienz der Blattdüngung auf drei Arten erhöht: bessere Verteilung und bessere Netz-/Haftwirkung auf dem Blatt und dadurch eine verbesserte Pflanzenaufnahme. F3 senkt die Oberflächenspannung der Gießwassertropfen, sodass die Nährstoffe sich besser über die Blätter verteilen. Dies führt zu einer größeren Blattbenetzung und einer verbesserten Nährstoffaufnahme. Außerdem werden mehr Nährstoffe an der Blattoberfläche fixiert, anstatt herunterzulaufen oder abzuprallen. Darüber hinaus ermöglicht die F3-Technologie die Bildung kleiner Nährstoffdepots auf der Blattoberfläche, die nach einer Wiederbefeuchtung reaktiviert werden.

Vorteile

- Versorgt Pflanzen mit Eisen, wenn sie es brauchen
- Ideal für eine Vielzahl von Feldfrüchten, insbesondere Beerenobst und Weinreben
- Bessere Verteilung, Haftung und Rückhaltung

Anwendungshinweise

1. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere ICL Fachberater.

Aufwandmengen

Kulturempfehlungen	Dosierung* L/ha	Wasservolumen L/ha	Konz. (%)	Zeitpunkt
Fruchtgemüse	3-6	300-600	1	Während des gesamten Kulturzyklus, 3-4 Mal
Erdbeere	3-6	250-400	1.2-1.5	Während des gesamten Kulturzyklus, 3-4 Mal
Heidelbeere	3-6	250-400	1.2-1.5	Während des gesamten Kulturzyklus, 3-4 Mal
Beerenobst	3-6 5-8	600-1000	0.5-0.6 0.8	Während des gesamten Kulturzyklus, 3-4 Mal Behebung von Mangelsymptomen
Kern und Steinobst	3-5 5-7	600-1000	0.5-0.6 0.8	Nach Fruchtbildung bis Ernte, 1-2 Mal Behebung von Mangelsymptomen
Weinbau	3-5 5-7	600-1000	0.5-0.6 0.8	Während des gesamten Kulturzyklus, 3-4 Mal Behebung von Mangelsymptomen
Zierpflanzen	2-3	600-1000	0.3	Während des gesamten Kulturzyklus, 3-4 Mal

* Verwenden Sie niedrigere Dosierungen bei geringerer Wassermenge/ha und höhere Dosierungen, wenn die Wassermenge erhöht wird. Düngen Sie zuerst eine kleine Fläche, bevor Sie die Dosierung oder andere Variablen ändern. Da die Gegebenheiten unterschiedlich sein können und die Anwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegt, kann ICL nicht für nachteilige Ergebnisse verantwortlich gemacht werden.

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.