



AGROCOTE®

44-0-0 | 3-4 M

Stetiger Stickstoff- und Wachstumsschub

44 | 0 | 0
N P₂O₅ K₂O



Garantierte Analyse

Oxid		
N	Gesamtstickstoff (N)	44%
	Carbamidstickstoff (N-Ur)	44.0%
P ₂ O ₅	Phosphorpentoxid	0%
K ₂ O	Kaliumoxid	0%

Eigenschaften

Wirkungsdauer 3-4 Monate

Produktbeschreibung

Agrocote® 44-0-0 | 3-4 M eignet sich für Kulturen mit hohem Stickstoffbedarf. Mit einer einzigen Düngung vor der Pflanzung oder Aussaat wird die Kultur während der gesamten Vegetationsperiode versorgt. Die Laufzeit von 3-4 Monaten eignet sich ideal für Kulturen mit langer Kulturdauer, wie z.B. Kohlgemüse, Lauch oder Kartoffeln auf leichten Standorten. Dank der hochmodernen, patentierten Freisetzungstechnologie von ICL erhalten Ihre Kulturen eine nachhaltige, kontrollierte und zuverlässige Stickstoffversorgung auf Harnstoffbasis über einen garantierten Zeitraum von 3-4 Monaten (basierend auf einer durchschnittlichen Bodentemperatur von 21 °C; bei kühleren Bodentemperaturen oder frühem Ausbringen damit verlangsamer Umsetzung von Harnstoff verlängert sich die Freisetzung auf 5 Monate). Während der gesamten Laufzeit werden Stickstoffverluste minimiert, die Verfügbarkeit für die Pflanzen gesteigert und damit die Nährstoffnutzungseffizienz maximiert.

Vorteile

- Erhöht den Ertrag, oder hält ihn konstant bei geringerer Aufwandmenge
- Erhöht die Stickstoffeffizienz
- Einfacher All-in-One-Basisdünger

Anwendungshinweise

- 1 Auszubringen in Reihen- oder breitwürfiger Ablage.
- 2 Nicht früher als 1-2 Wochen vor der Pflanzung auftragen.
- 3 5-10 cm tief in den Boden einarbeiten.
- 4 Den Dünger möglichst unter den Tropfern ausbringen.
- 5 Nach der Anwendung gießen.
- 6 Dosierung reduzieren bei der Kombination mit wasserlöslichen Düngemitteln in der zweiten Hälfte der Vegetationsperiode.
- 7 Trocken lagern.
- 8 Angebrochene oder beschädigte Beutel bitte ordnungsgemäß verschließen.
- 9 Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere ICL Fachberater.

Aufwandmengen

Kultur	Mengenempfehlung
Kartoffeln	150-400 kg/ha
Obst und Freilandgemüse	150-400 kg/ha

Besondere Hinweise: Führen Sie zunächst einen Versuch in kleinem Maßstab durch, bevor Sie die Dosierung oder andere Variablen verändern. Da sich die Einsatzbedingungen vor Ort unterscheiden können und die Produkthanwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt, kann ICL nicht für nachteilige Ergebnisse haftbar gemacht werden.

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.