



# AGROCOTE®

43-0-0 | 4-5 M

Stickstoffschub für profitables Wachstum

43 | 0 | 0  
N P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> K<sub>2</sub>O



## Garantierte Analyse

| Oxid                          |                           |       |
|-------------------------------|---------------------------|-------|
| N                             | Gesamtstickstoff (N)      | 43%   |
|                               | Carbamidstickstoff (N-Ur) | 43.0% |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | Phosphorpentoxid          | 0%    |
| K <sub>2</sub> O              | Kaliumoxid                | 0%    |

## Eigenschaften

Wirkungsdauer 4-5 Monate

## Produktbeschreibung

Agrocote® 43-0-0 | 4-5M versorgt langsam wachsende Kulturen mit einer längeren Kulturdauer zuverlässig mit Stickstoff. Mit einer einzigen Düngung, auch zur Pflanzung, wird die Kultur über 4-5 Monate hinweg versorgt. Ideal eignet sich diese Laufzeit für Gehölze oder Weihnachtsbaumkulturen auf schwereren Standorten. Dank der patentierten Freisetzungstechnologie von ICL erhalten Ihre Kulturen eine nachhaltige, kontrollierte und zuverlässige Stickstofffreisetzung auf Harnstoffbasis über einen garantierten Zeitraum von 4-5 Monaten (basierend auf einer durchschnittlichen Bodentemperatur von 21 °C; bei kühleren Bodentemperaturen oder frühem Ausbringen und damit verlangsamer Umsetzung von Harnstoff verlängert sich die Freisetzung auf 6 Monate). Während der gesamten Laufzeit werden Stickstoffverluste minimiert, die Verfügbarkeit für die Pflanzen gesteigert und damit die Nährstoffnutzungseffizienz maximiert.

## Vorteile

- Erhöht den Ertrag, oder hält ihn konstant bei geringerer Aufwandmenge
- Ersetzt als Basisdünger vielfache Einzeldüngungen
- Reduziert Nährstoffverluste durch Denitrifikation, Auswaschung oder Verflüchtigung

## Anwendungshinweise

- 1 Auszubringen in Reihen- oder breitwürfiger Ablage.
- 2 Nicht früher als 1-2 Wochen vor der Pflanzung auftragen.
- 3 5-10 cm tief in den Boden einarbeiten.
- 4 Den Dünger möglichst unter den Tropfern ausbringen.
- 5 Nach der Anwendung gießen.
- 6 Dosierung reduzieren bei der Kombination mit wasserlöslichen Düngemitteln in der zweiten Hälfte der Vegetationsperiode.
- 7 Trocken lagern.
- 8 Angebrochene oder beschädigte Beutel bitte ordnungsgemäß verschließen.
- 9 Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere ICL Fachberater.

## Aufwandmengen

| Kultur                     | Mengenempfehlung |
|----------------------------|------------------|
| Weihnachtsbäume            | 150-400 kg/ha    |
| Neuanlage von Obstgehölzen | 150-400 kg/ha    |

Besondere Hinweise: Führen Sie zunächst einen Versuch in kleinem Maßstab durch, bevor Sie die Dosierung oder andere Variablen verändern. Da sich die Einsatzbedingungen vor Ort unterscheiden können und die Produkthanwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt, kann ICL nicht für nachteilige Ergebnisse haftbar gemacht werden.

## Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.