



AGROMASTER®

16-8-16 (High NK) | 5-6 M

Kulturen auf lange Sicht versorgt

16 | 8 | 16 | 5.0 | 16.0
N P2O5 K2O MgO SO3



Garantierte Analyse

Oxid		
N	Gesamtstickstoff (N)	16%
	Nitratstickstoff (N-NO3)	1.2%
	Ammoniumstickstoff (N-NH4)	3.0%
	Carbamidstickstoff (N-Ur)	11.8%
P2O5	Phosphorpentoxid	8%
	Wasserlösliches (P2O5)	6.0%
K2O	Kaliumoxid	16%
	Wasserlösliches (K2O)	16.0%
MgO	Magnesiumoxid	5.0%
SO3	Schwefeltrioxid	16.0%

Produktbeschreibung

Agromaster® 16-8-16+5MgO+16SO3 | 5-6M ist speziell für lange Vegetationszeiten formuliert, da sein sehr hoher Gehalt an umhülltem Granulat die Nährstoffe über 5 – 6 Monate freisetzt. Es ist damit ideal geeignet für Kulturen wie Einlegegurken, Kohl oder Lauch. Sein ausgewogenes Verhältnis von Stickstoff zu Kalium lässt Pflanzen stetig und gleichmäßig wachsen. Eine außreichende Portion Magnesium sorgt für optimale Photosynthese, während der zugesetzte Schwefel eine verbesserte Stickstoffaufnahme ermöglicht. Durch die Controlled Release Technologie vermindert sich die Salzbelastung zu Beginn der Kultur, sie bewirkt eine hocheffiziente Nährstofffreisetzung und minimiert die Verluste, sodass die Kulturen insgesamt mehr von dem Dünger profitieren. Das zeigt sich messbar höheren Ernteerträgen.

Vorteile

- \\ Ausgewogenes NK-Verhältnis, mit zugesetztem Magnesium und Schwefel für nachhaltiges Wachstum
- \\ Höherer Ertrag, oder weniger Verbrauch bei gleichem Ertrag
- \\ Langfristige kontrollierte Freisetzung für längere Erntezyklen

Anwendungshinweise

- 1 Auszubringen in Reihen-, Punkt- oder breitwürfiger Ablage.
- 2 5-10 cm tief in den Boden einarbeiten.
- 3 Unter den Tropfern ausbringen.
- 4 Nach der Anwendung gießen.
- 5 Trocken lagern.
- 6 Angebrochene oder beschädigte Beutel bitte ordnungsgemäß verschließen.
- 7 Dosierung reduzieren bei der Kombination mit wasserlöslichen Düngemitteln in der zweiten Hälfte der Vegetationsperiode.
- 8 Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere ICL Fachberater.

Aufwandmengen

Kultur	Mengenempfehlung
Mittlere bis lange Erntezyklen im geschützten Anbau: Tomaten, Paprika, Auberginen, Gurken	400-800 kg/ha

Besondere Hinweise: Führen Sie zunächst einen Versuch in kleinem Maßstab durch, bevor Sie die Dosierung oder andere Variablen verändern. Da sich die Einsatzbedingungen vor Ort unterscheiden können und die Produktanwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt, kann ICL nicht für nachteilige Ergebnisse haftbar gemacht werden.

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.