



Solinure®

Blau

Das Standard-Nährsalz für den Kulturstart

19 | 7 | 20 | 2.0 | TE
N P₂O₅ K₂O MgO



Garantierte Analyse

Oxid		
N	Gesamtstickstoff (N)	19%
	Nitratstickstoff (N-NO ₃)	10.9%
	Ammoniumstickstoff (N-NH ₄)	8.1%
P ₂ O ₅	Phosphorpentoxid	7%
	Wasserlösliches (P ₂ O ₅)	7.0%
K ₂ O	Kaliumoxid	20%
	Wasserlösliches (K ₂ O)	20.0%
MgO	Magnesiumoxid	2.0%
	Wasserlösliches (MgO)	2.0%
B	Bor	0.02%
	Wasserlösliches (B)	0.02%
Cu	Kupfer	0.015%
	Wasserlösliches (Cu)	0.015%
Fe	Eisen	0.08%
	Wasserlösliches (Fe)	0.08%
	EDTA-Chelat	0.05%
	DTPA-Chelat	0.03%
Mn	Mangan	0.025%
	Wasserlösliches (Mn)	0.025%
	EDTA-Chelat	0.025%
Mo	Molybdän	0.004%
	Wasserlösliches (Mo)	0.004%
Zn	Zink	0.028%
	Wasserlösliches (Zn)	0.028%

Produktbeschreibung

Der Fertigungsdünger Solinure® Blau eignet sich ideal für den Kulturstart oder zur Regeneration nach Stress von Kulturen im gewachsenen Boden. Zur Blütenindikation oder Fruchtbildung ist das Mischen mit einem kalkhaltigen Solinure®-Produkt möglich.

Vorteile

- \\ Ausgeglichene Formulierung für den Start oder die zweite Phase der Kultur
- \\ Hoher Mg-Gehalt für gesundes Wachstum und starke Photosyntheseleistung
- \\ Nitratbetonte Formulierung für schnelle Wirkung
- \\ Reine Rohstoffe
- \\ Komplette Versorgung: alle Haupt- und notwendige Spurenelemente
- \\ Qualität: ständige Prüfung der Inhaltsstoffe, Produktion und Beständigkeit

Eigenschaften

Anwendungshinweise

- 1 Verwenden Sie Solinure® Blau während der Startphase vor der Hauptblüte Ihrer Kultur.
- 2 Trocken lagern.
- 3 Angebrochene oder beschädigte Beutel bitte ordnungsgemäß verschließen.
- 4 Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere ICL Fachberater.

Aufwandmengen

Solinure Blau ist speziell für die Aufbauphase vor der Hauptblüte. Ausbringung: 4-5 kg/1000m² pro Woche oder 25-50kg/ha und Woche. Kontaktieren Sie Ihren ICL SF Fachberater für spezielle Anwendungshinweise.

Mengenempfehlung: 25-50 kg/ha pro Woche.

Düngen Sie zuerst eine kleine Fläche, bevor Sie die Dosierung oder andere Variablen ändern. Da die Gegebenheiten unterschiedlich sein können und die Anwendung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegt, kann ICL nicht für nachteilige Ergebnisse verantwortlich gemacht werden.

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.