

AGROMASTER®

Getreide K+

Der K-betonte Profi für Sommer- und Wintergetreide

14 | 6 | 22 | 6.5 | 2.0 | 11
N P2O5 K2O CaO MgO SO3



Garantierte Analyse

Oxid		
N	Gesamtstickstoff (N)	14%
	Nitratstickstoff (N-NO3)	2.5%
	Ammoniumstickstoff (N-NH4)	5.4%
	Carbamidstickstoff (N-Ur)	6.1%
P2O5	Phosphorpentoxid	6%
	Wasserlösliches (P2O5)	5.3%
K2O	Kaliumoxid	22%
	Wasserlösliches (K2O)	22%
CaO	Kalziumoxid	6.5%
	Wasserlösliches (CaO)	3.0%
MgO	Magnesiumoxid	2.0%
	Wasserlösliches (MgO)	1.0%
SO3	Schwefeltrioxid	11%

Produktbeschreibung

Agromaster® Getreide K+ (14-6-22+6.5CaO+2MgO+11SO3) ist ein sehr K-betonter NPK-Mischdünger, der mit seiner Kombination aus schneller N-Startwirkung und nachhaltiger N-Freisetzung aus der Umhüllungstechnologie eine hervorragende Anfangsversorgung zum Wachstumsbeginn im Frühjahr liefert und gleichzeitig die weitere Versorgung während der Vegetation gewährleistet. Dabei wird schwächer K-versorgte Böden oder auswaschungsgefährdete Standorte (z.B. im Falle feuchter Frühjahre auf leichten Böden) zuverlässig Kalium zugeführt. Start- und Schossergabe werden in einem Arbeitsgang zusammengefasst. Der enthaltene wasserlösliche Phosphor fördert die Bestockung des Getreides. Erhältlich im 1000 kg BigBag.

Vorteile

- Hoher K-Gehalt
- Besonders geeignet für Sommer- und Wintergetreide auf feuchten Standorten oder Böden mit hoher K-Auswaschung
- Sofortige N-Verfügbarkeit verbunden mit langsam fließenden N
- Rundum-Nährstoffversorgung mit nur einem Arbeitsgang

Anwendungshinweise

- 1 Auszubringen in Unterfuß-, Reihen-, oder breitwürfiger Ablage.
- 2 5-10 cm tief in den Boden einarbeiten.
- 3 Trocken lagern.
- 4 Angebrochene oder beschädigte Beutel bitte ordnungsgemäß verschließen.
- 5 Dosierung reduzieren bei der Kombination mit wasserlöslichen Düngemitteln in der zweiten Hälfte der Vegetationsperiode.
- 6 Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere ICL Fachberater.

Aufwandmengen

Kultur	Aufwandmenge/ha	Zeitpunkt
Winterraps	600-900 kg/ha	Frühjahr
Wintergetreide	500-700	Frühjahr
Sommergetreide (Hafer, Braugerste)	500-600	Zur Aussaat im März

Besondere Hinweise: Führen Sie zunächst einen Versuch in kleinem Maßstab durch, bevor Sie die Dosierung oder andere Variablen verändern. Da sich die Einsatzbedingungen vor Ort unterscheiden können und die Produktanwendung außerhalb unserer Kontrolle liegt, kann ICL nicht für nachteilige Ergebnisse haftbar gemacht werden.

Achtung

Beachten Sie die Hinweise auf dem Verpackungsetikett. Für individuelle, auf Ihre Ausgangssituation basierende Anwendungshinweise und Empfehlungen, kontaktieren Sie Ihren ICL Fachberater.