



Solinure®

20-20-20+TE

Fertilizante equilibrado para uso en cualquier fase del cultivo.

20 | 20 | 20 | TE
N P₂O₅ K₂O



Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	20%
	Nitrógeno nítrico (N-NO ₃)	4.3%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH ₄)	3.4%
	Nitrógeno ureico (N-Ur)	12.3%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	20%
	Soluble en agua (P ₂ O ₅)	20.0%
K ₂ O	Óxido de potasio	20%
	Soluble en agua (K ₂ O)	20.0%
B	Boro	0.01%
	Soluble en agua (B)	0.01%
Cu	Cobre	0.002%
	Soluble en agua (Cu)	0.002%
	Quelutado por EDTA (Cu)	0.002%
Fe	Hierro	0.04%
	Soluble en agua (Fe)	0.04%
	Quelutado por EDTA (Fe)	0.04%
Mn	Manganeso	0.01%
	Soluble en agua (Mn)	0.01%
	Quelutado por EDTA (Mn)	0.01%
Mo	Molibdeno	0.002%
	Soluble en agua (Mo)	0.002%
Zn	Zinc	0.002%
	Soluble en agua (Zn)	0.002%
	Quelutado por EDTA (Zn)	0.002%

Características

CE a 1 g/l:	0.799 mS/cm
pH (a 1g/l):	5.4
Pobre en cloruro (PCI):	Cl < 2%

Descripción

Solinure 20-20-20+TE es especialmente equilibrado para uso general en cualquier fase del cultivo. Es un fertilizante libre de cloruros y que incluye un completo pack de micronutrientes para obtener producciones de mejor calidad.

Beneficios

- \\ Solinure 20-20-20+TE no contiene cloruro
- \\ Fiable
- \\ Diseños inteligentes: una gama completa con el equilibrio adecuado para cada necesidad
- \\ Equilibrios especiales: particularmente útil para la producción de invierno, frío y poca luz
- \\ Materiales limpios: Ingredientes con pocas impurezas
- \\ Nutrición completa con pack de micronutrientes quelatados
- \\ Orientación según valor: todos los componentes necesarios sin un coste extra
- \\ Estricto control de los ingredientes, la fabricación y su consistencia

Instrucciones de uso

- 1 Guarde el producto en un lugar seco.
- 2 Cierre herméticamente los sacos empezados o dañados.
- 3 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Dosis recomendadas

A modo general, diluir 100-150 kg de Solinure en 1.000 litros de agua en el tanque de solución madre, e inyectar según demanda del cultivo. Contacte para una recomendación o sugerencia específica.

Atención Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.